Compression

Indication

La compression est indiquée sur toute plaie qui saigne abondamment.

Justification

La compression des vaisseaux sanguins, au niveau d'une plaie, arrête le saignement.

Réalisation

Compression manuelle

- appuyer[8] fortement sur l'endroit qui saigne[9] ;
- interposer le plus tôt possible entre la main et la plaie une épaisseur de tissu (mouchoirs, torchons, vêtements, etc), si possible propre, pour augmenter la compression ;
- maintenir la compression de la plaie jusqu'au relais par un pansement compressif.

Pansement compressif

Un pansement compressif est indiqué si :

- la victime ne peut pas appuyer elle-même,
- l'hémorragie est déjà contrôlée par la compression manuelle,
- le secouriste doit se libérer (exemple : pour alerter, pour réaliser un geste vital, etc.),
- et que l'endroit qui saigne n'est pas situé au cou, à la tête, au thorax ou à l'abdomen.

Ainsi que face à une amputation ou un arrachement d'une partie du corps.

Pour le réaliser :

- recouvrir complètement la plaie par une épaisseur de tissu (mouchoirs, torchons, vêtements, etc.), si possible propre ;
- fixer ce tissu à l'aide d'un lien large (ou une bande élastique) assez long ;
- serrer suffisamment et maintenir ainsi l'arrêt du saignement.

Si le saignement se poursuit après la mise en place d'un pansement compressif, reprendre la compression manuelle par-dessus le pansement compressif.

Points clés

La compression doit être :

- suffisante pour arrêter le saignement ;
- permanente.

---

[8] *Si le secouriste ne peut lui-même maintenir la compression, par exemple s'il existe de nombreuses victimes, il peut demander à la victime ou à un témoin (en s'assurant de sa protection), s'il en est capable, d'appuyer.*

[9] *Avec ce qui est efficace au regard de la situation et qu'on peut maintenir aisément : avec la ou les mains, si possible protégées par des gants à usage unique ou un sac plastique, voir si nécessaire le genou.*