[02FT08 / 07-2026] PSC

Insufflations

Indication

Cette technique est indiquée en présence d'une victime en arrêt cardiaque.

Justification

Cette technique permet d'apporter de l'air aux poumons d'une victime en arrêt cardiaque.

Réalisation

- libérer les voies aériennes de la victime et maintenir cette position durant les insufflations ;

Chez l'adulte et l'enfant

- pincer[1] le nez de la victime entre le pouce et l'index de la main tenant le front ;
- ouvrir légèrement la bouche de la victime en utilisant l'autre main et maintenir le menton élevé ;
- inspirer, sans excès ;
- appliquer la bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fermement[2] ;

Chez le nourrisson

- englober avec la bouche à la fois la bouche et le nez de la victime ;

Dans tous les cas

- insuffler progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever[3] ;
- se redresser légèrement tout en maintenant la bascule de la tête en arrière afin de :
    - reprendre son souffle ;
    - vérifier l'affaissement de la poitrine de la victime.
- insuffler une seconde[4] fois dans les mêmes conditions.

Si le ventre ou la poitrine de la victime ne se soulève pas lors des insufflations :

- s'assurer que la tête de la victime est en bonne position et que son menton est élevé ;
- s'assurer qu'il y a une bonne étanchéité et pas de fuite d'air lors de l'insufflation ;
- rechercher la présence d'un corps étranger dans la bouche. Le retirer avec les doigts, si nécessaire.

Points clés

Les deux insufflations doivent :

- être lentes et progressives ;
- cesser dès le début du soulèvement de la poitrine ;
- être réalisées en 5 secondes maximum.

---

[1] Le pincement du nez empêchera toute fuite d'air par le nez lors des insufflations.
[2] La pression ferme autour de la bouche de la victime empêchera toute fuite d'air durant les insufflations.
[3] durant 1 seconde environ.
[4] La durée de réalisation de ces deux insufflations successives ne doit pas excéder 5 secondes La réalisation rapide des manœuvres d'insufflation permet de ne pas retarder la reprise des compressions thoraciques.