

Pansement compressif

Indication

Le pansement compressif est indiqué pour relayer une compression manuelle efficace, lorsque la localisation le permet.

Justification

La pose d'un pansement compressif permet de libérer le secouriste tout en maintenant une pression suffisante sur la plaie qui saigne pour arrêter l'hémorragie.

Matériel

- **Pansement compressif improvisé** : un paquet de plusieurs compresses ou un pansement « américain » et une bande élastique adhésive ou autoagrippante ;
- **Pansement compressif d'urgence¹** pouvant contenir dans le même emballage :
 - un tampon de mousse, une compresse stérile et une bande élastique ;
 - une bande élastique équipée d'un tampon de gaze, une languette de maintien (applicateur de pression) et un élément de fermeture.

L'élasticité de la bande est un élément important si l'on veut obtenir une pression suffisante pour maintenir l'arrêt du saignement.

Réalisation

Dans tous les cas

- placer le pansement sur la plaie² ;
- réaliser un bandage serré³ recouvrant complètement le pansement ;

Pansement compressif d'urgence

- suivre les instructions du fabricant, généralement :
 - retirer le pansement de son emballage sous vide après ouverture ;
 - si la plaie hémorragique forme une cavité (plaie profonde) la remplir de compresses ;
 - appliquer le pansement compressif sur la blessure ;
 - réaliser un tour complet pour bien plaquer le pansement ;
 - s'il dispose d'un applicateur de pression :
 - passer le bandage élastique dans la languette de maintien en plastique ;
 - tendre le bandage élastique en le ramenant en sens inverse, en tirant la languette de maintien en plastique vers le bas ;
 - enrouler le reste du bandage en le serrant sur le pansement compressif ;
 - fixer l'élément de fermeture à une des couches du bandage élastique à l'aide des crochets.

¹ De fabrication industrielle, exemples : coussin hémostatique, pansement de type israélien, pansement OLAES, etc.

² Si une compression manuelle a déjà été réalisée, la substitution de celle-ci par le pansement compressif doit être la plus rapide possible.

³ La pression doit être suffisante et éviter la reprise du saignement.

Pansement compressif improvisé

- recouvrir complètement la plaie par une épaisseur de tissu (mouchoirs, torchons, vêtements, etc.), si possible propre ;
- fixer ce tissu à l'aide d'un lien large (ou une bande élastique) assez long ;
- serrer suffisamment et maintenir ainsi l'arrêt du saignement.

Cas particuliers

Pour certaines localisations de plaie en zone « non garrotable », il est parfois possible de réaliser un pansement compressif en prenant appui sur un relief osseux opposé. Par exemple :

- cou avec contre-appui sur l'aisselle opposée ;
- aisselle avec contre-appui à la base du cou côté opposé ;
- fesse avec contre-appui sur le bassin ;
- pli inguinal avec contre-appui sur le bassin ;
- cuir chevelu avec contre-appui sur le menton.

Ces techniques sont particulièrement utiles en cas de nombreuses victimes où le secouriste ne peut pas rester fixé sur une seule victime.

Risques & Contraintes

Le pansement compressif peut être moins efficace qu'une compression manuelle. S'il est constaté une reprise du saignement au travers du pansement (suintement de sang) reprendre la compression manuelle par-dessus.

La compression doit être suffisante pour arrêter l'hémorragie. Si la victime se plaint d'une douleur importante à l'extrémité du membre ou si celle-ci devient froide, engourdie ou violacée (couleur du lit de l'ongle), demander un avis médical rapidement.

Certaines localisations ne permettent pas de comprimer suffisamment l'endroit qui saigne (cou, thorax, abdomen). Si l'on est dans l'impossibilité de réaliser ce pansement, la compression manuelle sera maintenue.

Évaluation

Le pansement compressif est efficace si le saignement est arrêté.