

Hémorragies extérieures

- Adapter la procédure en fonction de la localisation de l'hémorragie extérieurement (cf. tableau suivant)
- Poursuivre le bilan et surveiller attentivement la circulation.

Tableau 13: Conduite à tenir spécifique devant une hémorragie extérieurement

HEMORRAGIE EXTERIEUREMENT	CONDUITE A TENIR SPECIFIQUE
PAR LA BOUCHE	• allonger la victime sur le côté : • de préférence en position strictement horizontale, • en position demi-assise si elle ne supporte pas d'être allongée ou présente des signes de détresse respiratoire.
PAR LE CONDUIT DE L'OREILLE	• appliquer la conduite à tenir devant un traumatisme du crâne.
PAR LE NEZ : CONSECUTIF A UN CHOC MINIME (TRAUMATISME LOCAL)	• l'asseoir, tête penchée en avant (ne jamais l'allonger) ; • lui demander de se moucher vigoureusement ; • lui demander de comprimer les deux narines avec les doigts, durant 10 minutes sans relâcher ; • demander un avis médical si : ○ le saignement ne s'arrête pas ou se reproduit ; ○ le saignement survient après une chute ou un coup ; ○ la victime prend des médicaments, en particulier ceux qui augmentent les saignements.
CONSECUTIF A UN CHOC VIOLENT (TRAUMATISME DE LA TETE ET DE LA FACE)	• appliquer la conduite à tenir devant un traumatisme de la face.
VAGINALE	• allonger la victime, si elle présente une grossesse visible, il convient alors de l'allonger préférentiellement sur le côté gauche¹. • compléter le bilan : • en identifiant la couleur de l'écoulement (rouge, marron, liquide clair ou trouble), • en recherchant une éventuelle grossesse et des antécédents de grossesse pathologique (diabète, hypertension artérielle, etc.) • proposer à la victime de mettre des serviettes ou des pansements absorbants entre les cuisses.
AUTRES	• allonger la victime. • proposer à la victime de mettre des serviettes ou des pansements absorbants entre les fesses dans le cas d'un saignement anal.

¹ Le retournement sur le côté gauche de la femme enceinte permet d'éviter l'apparition d'une détresse par compression de certains vaisseaux sanguins de l'abdomen.