

Malaise et aggravation de maladie

Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;

Si la victime est consciente

- **soustraire** la victime aux facteurs¹ qui pourraient avoir déclenché la crise ;
- **installer** la victime en position d'attente, confortablement² et sans délai :
 - allongée ;
 - assise en cas de difficultés à respirer ;
 - sinon, dans la position où elle se sent le mieux.
- **poursuivre** le bilan ;
- **aider la victime** :
 - à dégrafer ses vêtements, en cas de gêne ;
 - à sa demande ou à la demande des secours, à prendre :
 - son traitement prescrit ;
 - du sucre en morceaux.
- **rassurer** la victime, lui demander de rester calme ;
- **transmettre** les informations recueillies pour avoir un avis médical et appliquer les consignes ;
- **protéger** de la chaleur, du froid ou des intempéries ;
- **poursuivre** le bilan et surveiller attentivement :
 - l'évolution des signes ;
 - l'aggravation vers une détresse vitale.

Devant des signes de maladie infectieuse³, appliquer les mesures barrières⁴, de distance physique et d'isolement ;

Cas particulier, devant un malaise vagal ou orthostatique

- appliquer la conduite à tenir devant une victime qui présente un malaise ;
- adapter la conduite à tenir avec :
 - inviter la victime à réaliser des manœuvres physiques si la victime :
 - **déclare** faire régulièrement des malaises « vagues » ;
 - **et présente** des signes tels que : étourdissement, nausées, sueurs, sensation de chaleur, points noirs devant les yeux ou sentiment de perte de conscience imminente.

¹ Exemple : foule, bruit, etc.

² Par exemple sur un brancard, un lit, une chaise, ou un canapé, ou à défaut sur le sol.

³ Et plus particulièrement en période épidémique.

⁴ Exemple : demander à la victime de porter un masque, toutefois, lui proposer de le retirer si cela gêne sa respiration.