

Crise convulsive généralisée

Chez l'adulte ou l'enfant

Au début de la crise	Pendant la crise	A la fin des convulsions
- allonger la victime au sol¹ ; - écarter les personnes qui sont autour.	- protéger la tête de la victime en glissant si possible un vêtement ou un tissu plié sous sa tête, sans recouvrir les voies aériennes ; - écarter tout objet qui pourrait être traumatisant ; - ne rien² placer entre les dents ou dans la bouche de la victime.	- s'assurer que les voies aériennes de la victime sont libres et vérifier sa respiration ; - appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ; - lorsque la victime redevient consciente, la garder au calme et la rassurer ; - réaliser une mesure de la glycémie capillaire.

Dans tous les cas

- ne jamais contraindre les mouvements de la victime durant toute la crise ;
- noter l'heure de survenue et la durée de la crise ;
- poursuivre le bilan, rechercher d'éventuels signes de traumatisme ;
- transmettre un bilan et appliquer les consignes ;
- surveiller la victime jusqu'à ce qu'elle retrouve un état normal de conscience.

Chez le nourrisson

La prise en charge est identique à celle de l'adulte, mais il faut en plus :

- prendre la température de l'enfant ;
- procéder à un refroidissement actif ;
- transmettre un bilan, systématiquement.

¹ Si elle n'est pas déjà dans cette position pour éviter qu'elle ne se blesse en chutant.

² Elle n'avalera pas sa langue.