

# Malaise hypoglycémique chez le diabétique

## Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;

## Après avoir pris en charge la victime qui a perdu connaissance et respire

- réaliser une mesure de glycémie capillaire lors du 4ème regard si le matériel est disponible.
- demander un avis médical en indiquant le résultat de la mesure de glycémie.

## Si la victime est consciente

- appliquer la conduite à tenir devant une victime qui présente un malaise ;
- adapter la conduite à tenir avec :
  - réaliser une mesure de glycémie capillaire lors du 4ème regard si le matériel est disponible ;

Si la victime est réveillée, réactive, et capable d'avaler, et que :

- la mesure de la glycémie est  $< 3,3$  mmol/l (ou  $< 60$  mg/dl ou  $< 0,6$  g/l) ;
- ou l'origine du malaise est inconnue :

- aider la victime à prendre :

- de préférence du sucre en morceaux ou en poudre

- adulte : 4 morceaux ou cuillères à café de sucre ;
    - enfants : 2 à 3 morceaux ou cuillères à café de sucre ;

- sinon :

- une boisson sucrée comme un jus d'orange ou du miel,
    - des bonbons contenant du sucrose.

- demander un avis médical en indiquant le résultat de la mesure de glycémie :

- si son état ne s'améliore pas rapidement,
  - en cas de doute.

- surveiller<sup>1</sup> la victime :

- si aucune amélioration ne survient au bout de 15 minutes suite à une ingestion de sucre, une seconde dose de sucre peut être prise.

<sup>1</sup> Il faut compter environ 10 à 15 minutes entre l'ingestion du sucre, une élévation de la glycémie et une amélioration des signes.