

Réaction allergique grave

Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;

Face à une réaction allergique grave avec signes de détresse¹

- appliquer la conduite à tenir devant une victime qui présente un malaise ;
- adapter la conduite à tenir avec :
 - éliminer tout contact² de la victime avec l'allergène si possible et si l'allergène est connu.
 - si la victime possède un traitement³ pour lutter contre les réactions allergiques graves :
 - administrer à la demande de la victime ou du médecin régulateur le traitement prescrit,
 - demander un avis médical immédiatement et appliquer les consignes,
 - surveiller la victime.

En l'absence d'amélioration ou en cas de récurrence dans les 5 minutes qui suivent la première injection, une deuxième injection à l'aide de l'auto-injecteur peut être réalisée. Si possible, demander un nouvel avis au médecin régulateur.

Face à une réaction allergique simple sans signes de détresse

- appliquer la conduite à tenir devant une victime qui présente un malaise ;
- adapter la conduite à tenir avec :
 - demander un avis médical et respecter les consignes : le médecin régulateur peut, même en l'absence de détresse vitale, demander qu'une auto-injection d'adrénaline soit réalisée.

¹ Détresse respiratoire : souffle court, sifflements à l'expiration, œdèmes des voies respiratoires, gonflement, voix rauque. Détresse circulatoire : chute de la tension artérielle, pouls rapide et difficile à percevoir, fréquence cardiaque s'accélère.

² Par exemple, supprimer le contact avec du latex si la victime est allergique au latex.

³ Auto-injecteur d'adrénaline - AIA