# Limiter l'aggravation d'une détresse vitale

## Détresse respiratoire

**Signes d'alerte**

**Apprécier**

- Confusion, somnolence, anxiété, agitation
- Cherche à rester assise
- Se plaint de difficultés à ventiler
- Ventilation bruyante : sifflement, gargouillement, râles  Ventilation rapide, superficielle, difficilement visible
- Tirage
- Battement des ailes du nez, creusement au-dessus du sternum, au niveau du creux de l'estomac
- Sueurs en l'absence d'effort
- Cyanoses (doigts, lobes des oreilles, lèvres)

**Mesurer**

- Fréquence > 30 mvts/min
- Saturation < 94%
- Saturation < 89% si IRC

oui

**Position : assise ou demi assise**

**Desserrer les vêtements**

**Inhalation d'oxygène**

## Détresse circulatoire

**Signes d'alerte**

**Apprécier**

- Somnolence, angoisse, agitation
- Pâleurs (extrémités, face interne de la paupière, lèvres)
- Marbrures cutanées (face antérieure des genoux)
- Peau moite
- Sueurs froides
- Pouls radial non perceptible alors que le pouls carotidien est perçu

**Mesurer**

- TRC > 2 sec
- FC < 40 bat/min ou  > 120 bat/min
- Tension systolique < 90 mmHg ou diminuée de 30% chez la victime hypertendue

oui

**Position d'attente : allongée**

**Réchauffer**

**Poursuivre bilan**

## Détresse neurologique

**Signes d'alerte**

**Apprécier**

- Somnolence, retard de réponse (question ou ordre)
- Désorientée
- Ne parle plus
- Paralysie
- Perte de la vue
- Convulsion
- Asymétrie du visage
- Asymétrie des pupilles à la lumière (faible intensité ou celle du jour)

**Mesurer**

- Score EVDA
- Glycémie capillaire < 0,6 g/l, 60 mg/dl

oui

**Position d'attente : allongée**

**Poursuivre bilan**

Protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries.
Poursuivre le bilan et surveiller attentivement la conscience de la victime et la respiration.

## Inhalation d'oxygène

- Détresse vitale et mesure $SpO^2$ impossible
- Saturation <94%
- Saturation <89% (IRC) même avec 1à2 l/min de plus que son débit habituel
- Intoxication CO
- Accident de plongée

Saturation <89% (IRC) : + 1à2 l/min de son débit initial

Diminuer le débit tant que l'objectif est atteint | adulte, enfant, nourrisson entre 94% et 98% | IRC entre 89% et 94%

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | l/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Utilisation du masque haute concentration (MHC)

Utilisation du masque simple (MS)

Utilisation des lunettes

Augmenter le débit si l'objectif est non atteint | adulte, enfant, nourrisson < 94% | IRC < 89%