
Prendre en charge un malaise



En complément de la procédure

AVC ou AIT — PSE2

- **Allonger** strictement (dos ou côté)
- **Prendre une glycémie capillaire**
- **Evaluer le score de** l'Accident Vasculaire Cérébral

Crise convulsive généralisé — OPT

Au début de la crise
- **Allonger** au sol
- **Ecarter** les personnes

Pendant la crise
- **Protéger** la tête du sol et objets autours
- **Noter** heure et durée de la crise

Après la crise
- **Evaluer** le 2ème regard
- **Prendre une glycémie capillaire**
- **Si nourrisson :** prendre température + refroidissement actif

Crise d'asthme — OPT

- **Asseoir**
- **Aider** à prendre son médicament

Douleur thoracique (NT) — PSE2

- **Réaliser un ECG** à la demande du médecin

Hypoglycémique — OPT

- **Prendre une glycémie capillaire**

Si mesure < 3,3mmol/l ou 60mg/dl ou 0,6g/l :
- **Resucrer** : adulte (4 sucres) | enfant (2 ou 3 sucres)
- **Contrôler** à l'issue de 10 à 15 min
- Si pas d'amélioration après 15 min, **resucrer** de nouveau

Réaction allergique grave — OPT

- **Procéder à l'Aider à prendre son médicament**
- En l'absence d'amélioration ou en cas de récidive au bout de 5 min, **procéder à une seconde injection (AIA)**