## Konvexe Optimierung

## 3. Übungsserie

Aufgabe 18

Aufgabe 21

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 4)^2$$
s.t. 
$$2x_1 + x_2 \le 6$$

Konvexität

Lösung Stelle Lagrange-Multiplikator für Nebenbedingung auf:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \mu) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 4)^2 + \mu(2x_1 + x_2 - 6)$$

Bilde partielle Ableitungen und setze gleich Null:

$$\nabla_{x_1} \mathcal{L}(x_1, x_2, \mu) = 2(x_1 - 3) + \mu \stackrel{!}{=} 0$$
  

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}(6 - \mu)$$
(1)

$$\nabla_{x_2} \mathcal{L}(x_1, x_2, \mu) = 2(x_2 - 4) + \mu \stackrel{!}{=} 0$$
  

$$\Rightarrow x_2 = \frac{1}{2} (8 - \mu)$$
(2)

$$\nabla_{\mu} \mathcal{L}(x_1, x_2, \mu) = 2x_1 + x_2 - 6 \stackrel{!}{=} 0$$
  

$$\Rightarrow 2x_1 = 6 - x_2$$
(3)

Löse das sich ergebende Gleichungssystem:

$$(1), (2), (3) \Rightarrow 2\left(\frac{1}{2}(6-\mu)\right) = 6 - \frac{1}{2}(8-\mu)$$

$$\Rightarrow 6 - \mu = 6 - \frac{1}{2}(8-\mu)$$

$$\Rightarrow -\mu = -\frac{1}{2}(8-\mu)$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{2}(8-\mu)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}\mu = 4$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{8}{3}$$

$$(4)$$

$$(1), (4) \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2} \left( 6 - \frac{8}{3} \right)$$
$$\Rightarrow x_1 = \left( 3 - \frac{1 \cdot 8}{2 \cdot 3} \right) = \frac{18}{6} - \frac{8}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$
 (5)

$$(2), (4) \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2} \left( 8 - \frac{8}{3} \right)$$
$$\Rightarrow x_2 = \left( 4 - \frac{1 \cdot 8}{2 \cdot 3} \right) = \frac{24}{6} - \frac{8}{6} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$
 (6)

Durch Einsetzen ergibt sich der Funktionswert:

$$\mathcal{L}\left(\frac{5}{3}, \frac{8}{3}, \frac{8}{3}\right) = \left(\left(\left(\frac{5}{3} - 3\right)\right)^2 + \left(\left(\frac{8}{3} - 4\right)\right)\right)^2 + \frac{8}{3}\left(\left(2 * \frac{5}{3} + \frac{8}{3} - 6\right)\right)$$

$$= \frac{16}{9} + \frac{16}{9} + \frac{8}{3}\left(\frac{18}{3} - \frac{18}{3}\right)$$

$$= \frac{32}{9}$$
(7)