Incidin® Extra N

Virsmu dezinfekcija bez aldehīdiem

- Nesatur aldehīdus
- Patentēts līdzeklis
- Ļoti patīkama smarža

Patīkama, tīroša virsmu dezinfekcija, kas bāzējas uz smaržas ziņā neitrālu un neiztvaikojošu darbīgo vielu.

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvumi		
⇒ Plašs iedarbības spektrs uz baktērijām (arī MRSA un Tbc), sēnītēm, HBV, HIV, Rota- vaccinia-, adeno-, papova- un herpes vīrusu.	⇒ Augsta dezinfekcijas drošība visām mazgājamām virsmām pat riska nozarēs, piem., sakarā ar iedarbību uz Rota-, adeno vīrusiem dezinfekcijas drošība bērnu iestādēs, iedarbība uz HBV, vaccinia vīrusiem nodrošina drošību OP blokos.		
⇒ Satur glukoprotamīnu	⇒ Nesatur aldehīdus. Laba materiālu izturība.		
⇒ Intensīva tīrīšana	⇒ Tīrīšana un dezinfekcija vienlaicīgi.		
⇒ Zema lietošanas koncentrācija	⇒ Ekonomisks, maz atkritumu no iepakojuma, mazāk patērētu resursu		
⇒ Antimikrobiāla iedarbība, kas bāzēta uz dabīgām izejvielām	Ļoti laba bioloģiskā sadalīšanās un tātad ieguldījums dabas aizsardzībā		
⇒ DGHM sertifikāts	⇒ Vislabākais nodrošinājums lietotājam		
⇒ Piemērots dozēšanas iekārtām DG 1, DG 2, DG 3, DZ 1, DZ 2	⇒ Vienkārša lietošana pie augstas dozēšanas precizitātes		
⇒ Plaši pārbaudīts materiālu izturīgums	 ⇒ Lietojams: metāliem, piem., misiņam, sinētiskiem materiāliem, piem., polikarbonātam, elastomēriem, piem., EPDM, grīdu segumiem, piem., linolejam 		

Sastāvs: antimikrobiālas vielas, bezjonu tenzīdi, šķīdinātājs, kompleksoni, krāsvielas, smaržvielas. 100g satur: 12,4 g glukoprotamīna, 15 g benzalkonija hlorīda.

Lietošanas joma	Vēlamais lietošanas veids	
Medicīniskā inventāra virsmu dezinfekcijas	,	
līdzeklis saskaņā ar medicīnas produktu likumu	ievērojot dozēšanas noteikumus.	
(MPG). Piemērots arī citām mazgājamām virsmām	- Nav jānomazgā	
	 Piemērots manuālai lietošanai 	

Mikrobioloģiskie un viroloģiskie rādītāji

	Koncentrācija (%)	Iedarbības laiks	
Virsmu dezinfekcija slimnīcās un	0,25	4 st.	
praksē (DGHM)	0,5	1 st	
	1,0	30 min.	
	2,0	15 min.	
Iedarbība uz MRSA	0,5	1 st.	
Iedarbība uz:			
- vaccinia (Elstree)	0,5	15 min.	
- adeno (Adenoid 6)	1,0	1 st.	
- papova SV 40 (777)	0,5	15 min.	
Iedarbība uz herpes vīrusiem	0,25	1 min.	
Iedarbība uz HBV antigēna testā,	0,25	2 st.	
ieskaitot HIV	0,5	30 min.	
	1,0	15min.	
Iedarbība uz HBV	0,5	2 st.	
	1,0	1 st.	
	2,0	30 min.	
Iedarbība uz <i>rota</i> vīrusiem	0,25	5 min.	
Iedarbība uz Tbc.	0,25	1 st.	
	1,0	30 min.	
Virsmu dezinfekcija pret Tbc.	1,5	4 st.	
	2,5	1 st.	
	4,0	30 min.	
	5,0	15 min	

Incidin ® Extra N pieejamās iepakojuma formas

The state of the s		
20 ml maisiņi, pa 400 gab kastē	400 x 20 ml	YEN 20
2 l uzpildāma pudele ar dozatoru	3 x 2 1	YEN 3 N
6 l plastmasas kanna	1 x 6 l	YEN 6
30 l plastmasas kanna	1 x 30 1	YEN 30
200 l plastmasas muca	1 x 200 l	YENF 2

Ievērībai

Plaši pārbaudīts — mikrobioloģiski, viroloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski. Lūdzu jautājiet pēc mūsu atsauksmju grāmatas. Ir veiktas materiālu izturības pārbaudes.

CE 0301