

Produkta apraksts

DEKASEPTOL GEL

Dezinfekcijas līdzeklis zobārstniecības atsūkšanas sistēmām un splaujamtraukiem.

Dimetildioktilamonija hlorīds

Glutamīnskābes un N-(C12-14-alkil)propilēndiamīna reakcijas produkti

Plašs iedarbības spektrs pret baktērijām (iesk. Tbc), rauga sēnēm un vīrusiem, ieskaitot B-hepatīta vīrusu (HBV), HIV un adeno vīrusus.

Riska frāzes:

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
Sargāt no bērniem.

Drošības frāzes:

Ja produkts nonācis kontaktā ar acīm, nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tīra tekoša ūdens. Ja saglabājas acu kairinājuma simptomi, meklēt medicīnisku palīdzību.

Nokļūstot uz ādas: noskalot ar tekošu ūdeni

Norijot: neizraisīt vemšanu, izņemot ja to dara medicīniskais personāls. Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

Paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Lietošana:

Resnā ūdens putekļu atsūkšanas caurule: 1) Iesūkt aukstu ūdeni caur KaVo Aquamat, vai izmantotiet plastikāta trauku. 2) Vienu reizi nospiež dozatoru ar atsūcēja uzgali vai roku. 3) Uzsūkt DEKASEPTOL gēlu no dozatora. 4) Atkārtot 1.-3. darbības. 5) Noņemt cauruli un novietojiet to vietā.

Tievais siekalu atsūcējs: 1) Iesūkt aukstu ūdeni caur KaVo Aquamat, vai izmantotiet plastikāta trauku. 2) Vienu reizi nospiež dozatoru ar atsūcēja uzgali vai ar roku. 3) Uzsūkt DEKASEPTOL gēlu no dozatora. 4) Noņemt cauruli un novietojiet to vietā.

Ķirurģiskā atsūcēja caurule (ja ir): 1) Iesūkt aukstu ūdeni caur KaVo Aquamat, vai izmantotiet plastikāta trauku. 2) Vienu reizi nospiež dozatoru ar atsūcēja uzgali vai ar roku. 3) Uzsūkt DEKASEPTOL gēlu no dozatora. 4) Noņemt cauruli un novietojiet to vietā.

Splaujamtrauks: 1) Vienreiz uz leju piespiež dozatoru. 2) Tvertnē ieliet DEKASEPTOL gēlu. 3) Ar birsti izlīdzināt DEKASEPTOL gēlu pa tvertnes virsmu un atstāt uz dažām minūtēm. 3) Noskalo ar trauka ūdens strūklu un birsti.