



Statin 降血脂藥物：安全用藥與副作用指南

本指南介紹常見的 Statin 類降血脂藥物，其主要功能為降低膽固醇以預防心血管疾病，並提供服藥期間的禁忌事項、漏藥處理及副作用應對流程。



安全用藥注意事項

藥物主要作用

 降低血中膽固醇及三酸甘油脂，減少心血管疾病及中風發作。



酒精會增加副作用風險



藥物可能導致皮膚對日曬敏感，應做好防曬。

漏服藥物的處理原則



想起時盡快補服；若接近下一次服藥時間則不補服，**絕不可一次服用雙倍劑量**

常見 Statin 類藥品之成分與商品名供核對



商品名 (中文)	主成份	含量
立普妥 (Lipitor)	Atorvastatin	20 毫克/錠



力清之 (Livalo)	含量
Pitavastatin	2 毫克/錠



冠脂妥 (Crestor)	含量
Rosuvastatin	10 毫克/錠



副作用識別與處理

需立即就醫的嚴重症狀

出現不明原因肌肉疼痛、虛弱、皮膚變黃（黃疸）或茶色尿液。



需回診告知的輕微不適

發生持續性脹氣、便秘、頭痛、視力模糊或異常出血。



術前重要提醒

若需進行外科或牙科手術，請務必主動告知醫師正在服用此藥。



遵照醫藥指示
請勿擅自停藥



立普妥不可以
和葡萄柚併服