

口服抗凝血劑(NOAC)用藥安全指南

適應症與用藥安全守則



藥物適應症

保護心血管，預防中風及血栓形成，遠離出血風險。



漏藥時的補服原則

想起時儘快補服；若接近下次服藥時間則跳過，絕不可服用雙倍劑量。



藥物與飲食交互作用

未經醫囑請勿併用阿斯匹靈、消炎止痛藥或金絲桃草。

常用劑量與服藥頻率參考

藥品商品名	常用劑量 (毫克)	每日服藥頻率
Eliquis (艾必克凝)	5 mg	每日兩次
Lixiana (里先安)	30, 60 mg	每日一次
Xarelto (拜瑞妥)	2.5, 10, 15 mg	每日一次 (15mg需隨餐)

Eliquis Film5 mg



Lixiana 30 mg



Lixiana 60 mg



居家安全與緊急就醫徵兆



預防出血的生活細節

改用軟毛牙刷與電動刮鬍刀，避免碰撞性運動與用力挖鼻孔。



術前主動告知醫療團隊

進行手術或牙科處置前，必須告知醫師正在服用抗凝血劑。



應立即就醫的危險警訊



出現血尿



黑便



牙齦出血
超過30分鐘



不明原因
嚴重頭痛

Xarelto 2.5 mg



10 mg



15 mg

