

# 普栓達(Pradaxa)用藥安全指南

**藥物作用：**是一種抗凝血劑，預防血栓形成，用於預防心房顫動引起的中風。

## 掌握正確服藥方式



**每日兩次，整顆吞服**

請勿弄破或咀嚼膠囊，以免藥品吸收不穩定。

110 mg

150 mg

110 mg

150 mg

**漏藥處理「六小時原則」**

距離下次服藥小於6小時則不補服，絕不可服用雙倍劑量。



**建議隨餐或飯後服用**

飯後服用可有效減少腸胃不適的症狀。

## 安全預防與緊急就醫



**降低出血風險的居家照護**

使用軟毛牙刷與電動刮鬍刀，並避免用力挖鼻孔或危險運動。



**手術或併用藥物須告知**

拔牙前或服用阿斯匹靈、中草藥前，必須先諮詢醫師。



**出現出血警訊應立即就醫**

若有血尿、黑便、嚴重流鼻血或不明瘀青，請即刻尋求醫療協助。

## 症狀嚴重程度與應對方式

| 症狀類型          | 應對方式              |
|---------------|-------------------|
| 血尿、黑便、嚴重頭痛、咳血 | <b>⚠️ 立即就醫 ⚠️</b> |
| 嚴重噁心、發燒、皮膚疹   | 告知醫師並持續觀察         |