



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени  
Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

**«Теория вероятностей»  
Домашняя работа № 2  
Вариант 12**

Студент Ильченко Е. А.

Группа ИУ7-54Б

Преподаватели Ринчино А. Л.

Москва, 2025

# Содержание

<b>Задание 1</b>	.....	<b>4</b>
<b>Задание 2</b>	.....	<b>5</b>

# Задание 1

**Условие:** Пассажир оставил вещи в автоматической камере хранения, а когда пришел их получать, вспомнил лишь, что в кодовой последовательности  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$  была подпоследовательность  $(2, 3)$ . Какова вероятность того, что он с первой попытки наберет нужный четырехзначный номер?

## Решение:

В контексте этой задачи под "подпоследовательностью" будем подразумевать, что цифры 2 и 3 идут подряд. То есть возможные позиции для пары  $(2, 3)$ :

Позиции 1 и 2:  $(2, 3, x_3, x_4)$

Позиции 2 и 3:  $(x_1, 2, 3, x_4)$

Позиции 3 и 4:  $(x_1, x_2, 2, 3)$

Определим общее число благоприятных исходов  $U$  нас есть 3 возможных положения для пары  $(2, 3)$ . Для каждого из этих случаев две оставшиеся позиции могут быть заняты любыми цифрами от 0 до 9.

Коды вида  $23\_$ :  $10 \cdot 10 = 100$  кодов.

Коды вида  $\_23\_$ :  $10 \cdot 10 = 100$  кодов.

Коды вида  $\_\_23$ :  $10 \cdot 10 = 100$  кодов.

Проверим пересечения: «23» одновременно на  $(1, 2)$  и  $(2, 3)$  невозможно (противоречие), и на  $(2, 3)$  и  $(3, 4)$  тоже невозможно. Единственная возможная пара пересечения —  $(1, 2)$  и  $(3, 4)$ : это последовательность:  $(2, 3, 2, 3)$ .

По формуле включений-исключений находим общее число благоприятных исходов:  $100 + 100 + 100 - 1 = 299$  кодов.

Тогда вероятность того, что пассажир с первой попытки наберет нужный четырехзначный номер равна:  $P = \frac{1}{299}$

**Ответ:**  $\frac{1}{299}$

## Задание 2

**Условие:** Завод изготавливает изделия, каждое из которых с вероятностью  $p = 0.01$  может иметь дефект. Каков должен быть объем случайной выборки, чтобы вероятность встретить в ней хотя бы одно дефектное изделие была не менее 0.95?

### Решение:

**Введем обозначения:**

- $p = 0.01$  – вероятность дефекта для одного изделия;
- $q = 1 - p = 0.99$  – вероятность того, что одно изделие годное;
- $n$  – объем выборки;
- событие  $A$  – в выборке хотя бы одно дефектное изделие;
- событие  $\bar{A}$  – все изделия в выборке без дефектов;

Поскольку выборка случайная, вероятность того, что все  $n$  изделий годные, равна:  
 $P(\bar{A}) = (0.99)^n$

Вероятности событий  $P(A)$  и  $P(\bar{A})$  связаны следующим соотношением:  $P(A) = 1 - P(\bar{A})$

**Составим неравенство**

Нам нужно, чтобы  $P(A) \geq 0.95$ . Подставим выражение для  $P(A)$ :

$$1 - P(\bar{A}) \geq 0.95$$

$$1 - (0.99)^n \geq 0.95$$

$$-(0.99)^n \geq 0.95 - 1$$

$$-(0.99)^n \geq -0.05$$

$$(0.99)^n \leq 0.05$$

Прологарифмируем обе части:

$$\ln((0.99)^n) \leq \ln(0.05)$$

$$n \cdot \ln(0.99) \leq \ln(0.05)$$

Так как  $\ln(0.99) < 0$ , то

$$n \geq \frac{\ln(0.05)}{\ln(0.99)} \approx 298.07$$

Так как объем выборки должен быть целым, то  $n = 299$

<b>Ответ:</b> $n = 299$
-------------------------