

Cliente:	BIMBO MONTERREY	Fecha:	29/01/2026
Nº del Reporte:	7627717	Fecha de la NC:	NO PROPORCIONADA
Semana:	5	Turno	PRIMER
Producto:	Roles glass	ATENDIDO POR:	LUIS DANIEL MÉNDEZ BARTOLO

HALLAZGO DE PLAGA	INFORMACION DEL PRODUCTO	
QUIEN DETECTA EL HALLAZGO	PRODUCTO:	Roles glass
Consumidor	FECHA DE PRODUCCION:	12/01/2026
	LOTE:	LBN23A2711:57
LUGAR DE HALLAZGO	FECHA DE CADUCIDAD:	02/02/2026
Domicilio del cliente	FECHA DE COMPRA	NO PROPORCIONADA
PLAGA ENCONTRADA	INCIDENCIA:	
MOSCA FORIDA	Se recibe reporte por parte de consumidor, hallazgo de mosca en el producto.	
CANTIDAD		
1		
IDENTIFICACION ESPECIFICA		
<u>Mosca phoridae</u>		
POSIBLE ORIGEN		
PRODUCCIÓN (BATIDOS)		
SE ELIMINA ORIGEN?		

Investigación

Se realiza identificación por medio de apoyo fotográfico, donde se determina la presencia de una mosca forida (Mosca phoridae) adulto. En los recorridos de inspección sobre las líneas de roles y panqueleria 2, constantemente se detectan derrames de huevo líquido, y contenedores con restos de masa en fermentación, los cuales sirven de atrayente y alimento para mosca forida adulta. Estos derrames continuamente son detectados en las plataformas de contenedor de huevo liquido.

IDENTIFICACIÓN	SOPORTE FOTOGRAFICO
	

Acción contenedora

Se realizan inspecciones a detalle en las líneas de producción de roles y panquelerias y 2, durante el recorrido se observo una fuga de huevo liquido en la tubería de panqueleria 2.

Como acciones contenedoras se realiza lo siguiente:

Se informa al maestro de sanidad para realizar la limpieza de los derrames de huevo.

Se programa aplicación en registros de drenaje para eliminación de larvas y adultos presentes en la tubería.

Investigación				
Analizando la evidencia fotográfica enviada por el cliente se realizan pruebas de reconocimiento en piso, biología del organismo, e históricos de actividad para validar la No Conformidad, tomando en cuenta lo anteriormente escrito, tenemos lo siguiente: 1. Este tipo de organismos es el que tiene mayor presencia en las área de producción en general. 2. Este tipo de organismo se alimenta de cualquier tipo de materia orgánica presente. 3. Tomando de referencia la imagen proporcionada por el cliente, el organismo parece estar por fuera del empaque, esto a juzgar por la sombra que proyecta sobre el mismo empaque del producto, se necesita la evidencia en físico para validar que se encuentra dentro del empaque. Más sin en cambio, esta línea es frecuente la actividad de mosca forida, esto debido a la acumulación de materia orgánica en las bases de las batidoras, espacios muertos entre maquinaria y enchaquetados, donde se acumula la materia orgánica y no es retirada en las limpiezas operacionales al final de cada turno. Así también es favorable la disponibilidad de humedad en las bases de batidoras, mezcladoras y espacios muertos de maquinaria, humedad que los organismos aprovechan para depositar sus huevecillos y completar su ciclo biológico, el cual completan entre 48 y 72 horas, gracias a la disponibilidad de refugio (espacios muertos) humedad y alimento (materia orgánica) presentes en las líneas.				
Plan de acción				
ACCIONES /ACTIVIDADES RECOMENDADAS	RESPONSABLE	FECHA TENTATIVA	FECHA SOLUCIÓN	CUMPLIMIENTO
Limpieza según AR de registros.	SEGA			
Aplicación de sales cuaternarias en el interior de los registros después de cada limpieza. (para eliminación de materia orgánica y huevecillos en tuberías)	SEGA			
Asegurar la limpieza operaria al final de cada turno (retiro de materia orgánica en las batidoras y limpieza de las plataformas de huevo)	Producción.			
Verificar el sellado de las bases de las batidoras y espacios muertos de maquinaria.	Servipro	29/01/2026		
Aplicación de insecticida residual según programa en registros de drenaje.	Servipro	01/02/2026		
Aplicación de piretrinas de manera focalizada en caso de actividad.	Servipro	Por actividad		
Inspecciones bajo programa para detectar desviaciones y áreas de oportunidad.	Servipro	29/01/2026		

Información complementaria.

NOMBRE COMÚN: Mosca phoridae/jorobada/corredora

NOMBRE CIENTÍFICO: Varios

CLASE/ORDEN/FAMILIA: Insecta/Diptera/Phoridae

METAMORFOSIS: Completa



BIOLOGÍA. La hembra deposita sus huevos sobre, dentro o al menos cerca, del alimento de las larvas, colocando de 1 a 100 a la vez y hasta 749 a lo largo de su vida. Tiene 3 instares larvales. La larva de tercer instar se arrastra hacia áreas más secas para pupar.

HÁBITOS. Los adultos frecuentemente pueden ser encontrados sobre materiales alimenticios de la larva, consistentes en materia orgánica húmeda y en descomposición.

En estructuras, los sitios de reproducción pueden incluir la película húmeda de materia orgánica que forra los tubos del drenaje, el residuo húmedo del fondo de los botes de basura, el material húmedo encontrado en las grietas de y bajo los equipos de cocina, en cubos de elevadores, contenedores de desperdicios, carnes y vegetales en descomposición, cabezas húmedas y sucias de trapeadores, sistemas sépticos defectuosos, etc. En las oficinas, la fuente suele ser las plantas de maceta con riego excesivo. Un sitio de reproducción particularmente difícil de localizar y corregir, es el que se forma cuando los tubos de drenaje tienen fuga o están quebrados por debajo del firme de concreto y las moscas se reproducen en la materia orgánica húmeda liberada y en el suelo saturado, para luego entrar a la estructura a través de grietas o hendidijas del firme.

CONTROL. Se deben seguir los 5 pasos de identificación, inspección, higiene, control mecánico/exclusión y, además, aplicación de insecticida si es requerida. La clave consiste en localizar y eliminar todos las fuentes de reproducción; no se debe detener hasta que todas las fuentes potenciales hayan sido inspeccionadas. Las trampas de luz para insectos son efectivas para capturar moscas adultas.

Referencias: Smith, E. H., & Whitman, R. C. (2003). Guía de campo de la NPMA para plagas estructurales. *National Pest*