(Cuidado)

cuidadão nas colunas
[illegible]

2.8.8 - Hábitos de sucção das crianças.
total: 615 + 190 + 588 + 618 = 2.011 crianças [illegible]

categoria	frequência	f. relativa	percentual
com hábitos de sucção	615	0,3058	30,58%
sucção de polegar	190	0,0945	9,45%
uso de chupeta	588	0,2924	29,4%
uso de mamadeira	618	0,3073	30,72%
total	2011	1,0000	100

2.8.9 - Das classes para os dos [illegible]

Amplitude total = 118 - 70 = 48 Kg. largura aproximada das
10 = 4,8 Kg.

Adotando largura de 5 Kg uma divisão possível
70 < 75, 75 < 80, 80 < 85 < 90 < 95, < 95 < 100 100 <

8.10 intervalos de classe e intervalos totais
as classes são 20 - 25, 25 - 30, 35 - 40, 40 - 45 e 45 -
largura de cada classe é 5 e intervalo total vai de
portanto a amplitude é 50 - 20 = 30

8.11
os 36 valores da tabela foram agrupados

(dias	frequência	
1 - 4	11	11/36 = 0,3056
5 - 8	13	13/36 = 0,3611
9 - 12	7	7/36 = 0,1944
13 - 16	4	4/36 = 0,1111
17 - 20	1	1/36 = 0,0278
total	36	1,0000

ora, usando os intervalos no enunciado

Intervalos solicitados	Frequência	F. relativa
1 dia	2	2/36 = 0,0556
2 ou 3 dias	6	6/36 = 0,1667

Intervalos solicitados	Frequência	Frequência relativa
4 a 7 dias	12	12/36 = 0,3333
8 a 14 dias	14	14/36 = 0,3889
Mais de 14 dias	2	2/36 = 0,0556
Total	36	1,0000

2.8.12 Intervalos de classe dos conjuntos A e B

Conjunto A: mínimo 24, máximo 70, amplitude = 70 - 24 = 46
sete classes, largura aproximada 7: 24-30, 31-37, 38-44
45-51, 52-58, 59-65, 66-72

Conjunto B: mínimo 187, máximo 821, amplitude = 821 - 187 =
634 oito classes, largura aproximada 80: 187-266

São escolhidos intervalos adequados; outros intervalos também
podem ser aceitos para não haver sobreposição e cubram
do mínimo ao máximo

2.8.13 → Taxa de abandono por zona de moradia
taxa de abandono = abandonaram ÷ total da zona × 100

Zona	Sim	Não	Total da zona
Urbana	15	80	95
Rural	70	35	105

Taxa de abandono
15/95 × 100 = 15,79%

70/105 × 100 = 66,67%

2.8.14 - Dentistas que [illegible]

Resposta	Frequência	Frequência r.	Percentual
Sim	78	78/100 = 0,78	78%
Não	22	22/100 = 0,22	22%
total	100	1,00	100%

2.8.15 - Frequência relativa dos óbitos por causas e sexo

Grupo de causas	Masculino	Feminino (n = 37[illegible]
infecciosas e parasitárias	27,437 (5,25%	18.675 (4.98%.)
neoplasias	76.065 (14,55%.)	64.724 (17.32%.)
Aparelho circulatório	150,782 (28,77)	46.369 (12.41%)
Aparelho respiratório	17,530 (10,67)	13.165 (3,52%.
[illegible]	167,570 (3,35%.)	20,368 (5,45
causas externas	88,563 (20,47%)	75,399 (20,17%)
Demais causas definidas	522,795 (16,94%	373,759 100%

2.8.16 - Frequências relativas por faixa etária

Faixa etária	Frequência	Frequência relativa
30 - 40	10	0,0345
40 - 50	66	0,2276
50 - 60	119	0,4103
60 - 70	66	0,2276
70 - 80	24	0,0828
0 e mais	5	0,0172
total	290	1,000

2.B.4 - Estágios da doença

contagem dos 20 pacientes leve = 8, moderado = 9, severo = 3

Estágio	Frequência	cálculo da freq. relativa	Percent.
leve	8	8÷20 = 0,40	40%
moderado	9	9÷20 = 0,45	45%
severo	3	3÷20 = 0,15	15%
total	20	1,00	100%

2.B.5 erros na distribuição de frequências

R. A classe 50-60 foi omitida a sequência foram de 40-50 diretamente para 60-70, deixando uma lacuna entre 50 a 60 sem classe

2B.6 tipos sanguíneos dos 40 doadores

contagem dos dados apresentados A = 16 B = 6 AB = 3 O = 15

Tipos sanguíneos	frequência	freq. relativa	percentual
A	16	16/40 = 0,400	40,0%
B	6	6/40 = 0,150	15,0%
AB	3	3/40 = 0,075	7,5%
O	15	15/40 = 0,375	37,5%
total	40	1,000	100%

2B.7 - Graus dos 80 alunos

percentual do grau A = 100% - 70% - 5% = 25% frequência
de A = 25% x 80 = 0,25 x 80 = 20 alunos

F, = f/

8,5

x Exercícios x

28.1 - Tipos de variáveis

	Tipo	Explicação
o peso de pessoas	quantitativa contínua	Pode assumir [illegible]
[illegible]	qualitativa nominal	categorias sem [illegible]
temperatura de [illegible]	quantitativa contínua	É uma medida que pode [illegible]
quantidade de [illegible]	quantitativa contínua	É medida [illegible]
religião	qualitativa nominal	categorias [illegible]
número de [illegible]	quantitativa discreta	contagem em números.
[illegible]	quantitativa discreta	contagem [illegible]
comprimento de [illegible]	quantitativa contínua	É uma medida

28.2 - Opinião de 852 pessoas
contrários = 852 - 425 = 368 pessoas

Opinião	Frequência	Fr. relativa	Perc
sem opinião / [illegible]	59	59/852 = 0,0692	6,9
Favoráveis	425	425/852 = 0,4988	49,
contrários	368	368/852 = 0,4319	43,
Total	852	1,0000	1

28.3 - completa tabela

Notas	Frequência	Frequência relativa
9 a 10	16	0,08
8 a 8,9	36	0,18
6,5 a 7,9	90	0,45
5 a 6,4	30	0,15
abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00