
3.5.9 Com base nos dados apresentados na Tabela 3.4 faça a distribuição de frequência. Depois, faça um histograma

Classes de pressão	Frequência Absoluta
63 ⊢ 69	1
69 ⊢ 75	4
75 ⊢ 81	7
81 ⊢ 87	10
87 ⊢ 93	7
93 ⊢ 99	1




3.5.10. Com base nos dados apresentados na Tabela 3.4 faça uma Tabela de distribuição de frequência. Depois, faça um poligono de frequência

Scanned By PDF Scanner

5,25 %.
4,98%.
14,55%
17,32%.
28,77%
36,13%
10,67%
12,41%
3,35%
3,52%
20,47%
5,45%
16,94%
20,17%


3.5.7 Desenhe um histograma para apresentar a distribuição de frequencias que você construiu no pedido no exercício 2.8.16




3.5.8 Desenhe um gráfico de barras (na posição horizontal) para apresentar a taxa de aprovação em cada área, usando os dados apresentados no 2.8.3 do capítulo 2.


Scanned By PDF Scanner

3.5.5. Desenha dois graficos de setores (um para cada barra de macaradia) para apresenta a distribuição de frequencia que voce construiu conforme pedido no exercicios 2.8./3







3.5.6 Desenha um grafico de barras (barras horizontais) para apresentar a distribuição de frequencia que voce construiu conforme pedida no Exercicios 2.8./5



3.5.3) Desenha um gráfico de setores para apresentar a distribuição de frequencia que você construiu conforme pedida no Exercício 2.8.8



3.5.4 Desenha um histograma para apresentar a distribuição de frequência que você construiu usando intervalos de classe iguais conforme pedido no exercício 2.8.11




Scanned By PDF Scanner

2.8.16. Coreimama de bora de lingua

Faixa etaria	N	%
30|-40	10	3,45%
40|-50	66	22,76%
50|-60	119	41,03%
60|-70	66	22,76%
70|-80	24	8,28%
80 e mais	5	1,72%
Total	290	100%

3.5.1) Desenhe um grafico de setores para apresentar a distribuição de frequencia que você construiu conforme pedido no Exercicio 2.8.4



3.5.2 Desenha um grafico de barra para apresentar a distribuição de frequencia que você construiu conforme pedido no Exercicio 2.8.5

Scanned By PDF Scanner

Total masculino = 522.795
Total feminino = 373.759
Total geral = 896,554

grupo de causa	Masc %	Fem %
Doenças infecciosa e parasitário	5,25%	4,98%
Neoplasias	11,55%	17,32
Doenças do aparelho circulatório	28,77%	36,13%
Doença do aparelho respiratório	10,67	12,41%
Afecção perinatal	3,35%	3,52%
Causa externa	20,47%	5,45
Demais causas definido	16,94%	20.17
Total	100%	100%

2.8.17 Taxa de aproveitamento de orgão

Orgão	Disponibil	Aproveitados	Taxa
Rim	210	210	100
Coração ligado pulmões	105	105	100
	105	105	100
	210	210	100

Intervalos A
24|-31, 31|-38, 38)-45, 45|-52, 52|-59,
59|-66, 66|-73

Conjunto B: N: 100, amin 187, amax 821
K = 1+3,3 log 100 = 7,6 = 8 classe
h = (821-187)/8 = 79,2 = 80

Intervalos B
187|-267, 267|-347, 347|-427, 427|-507,
507|-587, 587|667, 667|-747, 747|-827

2.8.13 Taxa de obandano da Tuberculose

Zona	Sim	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35
Total	85	115

2.8.14 100 dentistas e a prevenção

Enfatizam prevenção	N	%
Sim	78	78%
	22	22%
	100	100%

R: Sim a maioria (78%) d
adota prática da preven

2.8.15 Visita

Scanned By PDF Scanner

1: Tabela - Com classe iguais de 4 dias

Nº de dias	Frequência (N)	%
1 \ 1-5	10	27,8%
5 \ 1-9	12	33,3%
9 \ 1-13	6	16,7%
13 \ 1-17	5	13,9%
17 \ 1-21	3	8,3%
Total	36	100%

2: Tabela com intervalos

Nº de dias	Frequência (N)	%
1 dia	2	5,6%
2 ou 3 dias	6	16,7%
4 a 7 dias	10	27,8%
8 a 14 dias	14	38,9%
mais de 14 dias	4	11,1%
Total	36	100%

2.8.12 - São dados o valor e o valor mínima de dois conjunto A e B de dado, na primeira conjunto: $n = 50$ e no segundo $n = 100$. No conjunto A o valor mínimo e 24 e o valor e 70, no conjunta B, o valor de classe para cada conjunto.

$k = 1 + 3,3 \log n$

Conjunto A: $n = 50$

$K = 1 + 3,3 \log 50 = 6,6$

$h = (70 - 24) / 7 = 6,6$

Scanned By PDF Scanner

2.8.10. O numero de enfermeiras em serviço varia muito em um hospital. foi feita uma distribuição de frequencias com as seguintes classes: 20 ⊢ 25, 25 ⊢ 30, 30 ⊢ 35, 35 ⊢ 40, 40 ⊢ 45 45 ⊢ 50. Qual e o intervalo de classes e qual e o intervalo de todo a distribuição?

Intervalo de classe (tamanho da classe)

a) $h = 25 - 20 = 5$

5 enfermeiras

b) Intervalo de todo distribuição (amplitude total)

AT = limite maximo — limite menor

$AT = 50 - 20 = 30$

2.8.11 Construa uma tabela de distribuição de frequencias para apresentar os dados da tabela 2.19 usando intervalo de classes iguais. Depois faça outra tabela, com os seguintes intervalos: 1 dia 2 ou 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 11 dias, mais de 11 dias.

Tabela 2.19

7	8	1	7	13	6
12	12	3	17	4	2
4	15	2	14	3	5
20	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

Scanned By PDF Scanner

28.8. foram avaliados, por cirurgiões-dentistas com especialização em ortodontia, crianças na faixa de dentadura decídua entre 3 e 6 anos de idade. Não tinha hábitos de sucção 613. Dos demais, 190 tinha o hábito de sucção do polegar 588 usavam chupeta 618 usavam mamadeira. Apresente as todas em Tabela. Calcule o total e as frequência relativas

613 + 190 + 588 + 618 = 2,009

Hábito	Frequencia (N)	Frequencia relativo
Sem hábito	613	613/2009 = 30,52%
Sucção do polegar	190	190/2009 = 9,45%
Uso de chupeta	588	588/2009 = 29,27
Uso de mamadeira	618	618/2009 = 30,7%
Total	2009	

28.9- Os pesa dos bombeiro que trabalha em determinada cidade variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classe nas quais os pesos da bombeiro possam ser agrupados

amplitude total 118 - 70 = 48 kg

70 | 75
75 | 80
80 | 85
85 | 90
90 | 95
95 | 100
100 | 105
105 | 110
110 | 115
115 | 120

Scanned By PDF Scanner

2.8.7 Das 80 alunos que fizeram um curso de Estatistica, 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (frequencia) alunos receberam grau A supondo que nao tenha sido conferida mention em outro grau?

Total = 80 alunos

1. grau B: 70% de 80
80 x 0,70 = 56 alunos

2. grau C: 5% de 80
80 x 0,05 = 4 alunos

3 grau A: Ora de
80 - 56 - 4 = 20 alunos

Frequencia (N)	Frequencia relativa
20	25%
56	70%
4	5%
80	100%

Scanned By PDF Scanner

Estagio Doença	Frequência (N)	Frequência relativa
Leve	8	8/20=40%
Moderado	9	9/20=45%
Severo	3	3/20=15%
Total	20	100%

2.8.5. Qual é o erro na distribuição de frequencia dada seguida?

classe
20-30
30-40
40-50
60-70
70 e mais

É que falta uma classe
Falta a classe 50-60

2.8.6 - São dados os tipo de sangue de 40 doadores que se apresentaram na mes em um banco de sangue: B, A, O, A, A, A, B, O, B, A, A, AB, O, O, A, O, A, A, B, A, A, O, O, O, A, O, A, O, O A, O, AB, O, O, A, AB, B, B, calaque os dados em uma tabela de distribuição de frequencia

Tipo Sanguíneo	Frequência (fi)	Frequência relativa
A	15	15/40=37,5%
B	6	6/40=15%
O	16	16/40=40%
AB	3	3/40=7,5%
Total	40	100%

Scanned By PDF Scanner

2.8.4 - Uma doença pode ser classificada em três estagio (leve moderada e Setera). foram examinados 20 pacientes e obtidos os dados moderada, leve, leve, Setera, leve, moderado moderados, moderado, leve, leve, Setera leve moderada, leve Setera, moderada, moderado moderada, leve. Com base neste dados: a) determine a frequencia de cada categoria b) calcule a frequencia relativa de cada categoria.

Frequência absoluta (quantas vezes aparece)
leve 8 paciente
moderado 9
Setera: 3
Total 20

Scanned By PDF Scanner

2.8.1 Especifique o tipo das seguintes variáveis
a) Peso de pessoas b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo) c) temperatura de pessoas d) quantidade anual de chuva no cidade de São Paulo e) religião f) número de dentes permanentes incompleta em uma criança g) número de bebê nascida em uma maternidade h) com primento de cães.

A) peso de pessoas: Quantitativa Continua b) marca comercial de um mesmo analgésico: qualitativo nominal
c) temperatura de pessoa: quantitativo continuo

2.8.2 - Foco uma tabela para mostrar qual das 852 pessoas entrevistadas sabia determinado assunto, 59 não tinha opinião ou não conhecia o assunto, 425 eram favoráveis e os demais eram contrários.

sem opinião 59

Dados: Total 852.

Favoráveis 425 Contrários: 852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Nº de pessoas	Frequência Relativa
Favoráveis	425	49,88%
Contrários	368	43,19%
Sem opinião	59	6,93%
Total	852	100%

Scanned By PDF Scanner

2.8.1 Especifique o tipo das seguintes variáveis
a) peso de pessoas b) marcas comerciais de uma mesma analgésico (mesmo princípio ativa), c) temperatura de pessoas d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo e) religião f) número de dentes permanentes irrompida em uma criança g) número de bebê nascida em uma maternidade, h) com primento de cães.
A) peso de pessoas: quantitativa contínua b) marca comerciais de um mesmo analgésico: qualitativo nominal,
c) temperatura de pessoa: quantitativo contínuo

2.8.2 - Faça uma tabela para mostrar que das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinha opinião ou não conhecia o a assunto, 425 eram favoráveis e os demais eram contrários.

Dados: Total 852.
Favoráveis 425 Contrários: 852 - 59 - 425 = 368

opinião	Nº de pessoas	Frequência Relativa
favoráveis	425	49,88%
contrários	368	43,19%
Sem opinião	59	6,93%
Total	852	100%

Scanned By PDF Scanner