2.8.1) Especifique o tipo de variáveis

a) Peso de pessoas - variável quantitativa contínua.

b) Marcas comerciais de um mesmo
l analgésico - Variável quantitativa
nominal.

) temperatura de pessoas - variável quantita
iva contínua

) Quantidade anual de chuva na cidade de
São Paulo - variável quantitativa contínua.

) Religião - variável quantitativa nominal

) Número de bebês nascidos - Variável
quantitativa discreta.

) número de dentes - variável quantitativa
discreta.

) comprimento dos cães - variável quantitativ
contínua.

8.2) Dados
- total de pessoas - 852
- sem opinião - 59
- Favoráveis - 425
- contrários - ?

contrarias = 852 - (59 + 425)
= 852 - 484
= 368

opinião	Frequência
Sem opinião	59
Favoráveis	425
contrarias	368
total	852

2.9.3) Complete a tabela

Dados

- total de alunos = 200
- Frequência relativa = Frequência ÷ total

Calculo

200 × 0,08 = 16

Nota do aluno	Frequência	Frequência relat
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,00

- $\frac{36}{200} = 0,18$
- $\frac{90}{200} = 0,45$
- $\frac{30}{200} = 0,15$
- $\frac{28}{200} = 0,14$

2.8.4) Frequência e frequência relativa
20 pacientes em três categorias
leve = 8
Moderado = 9
Severo = 3

Frequência relativa $FR = \frac{f}{N}$

leve =
$$FR = \frac{8}{20} = 0,40$$

Moderado
$$FR = \frac{9}{20} = 0,45$$

Severo
$$FR = \frac{3}{20} = 0,15$$

categoria	Frequência	Freq relativa
leve	8	0,40
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
total	20	1,00

.8.5) O erro está na ausência de classe
50-60.
distribuição apresenta uma interrup
ntre 40-50 e 60-70, deixando valores
m classificação.

2.8.6) tipo de sangue
tem 40 doadores.
temos:
- tipo A = 16
- tipo B = 6

tipo AB = 3
tipo O = 15

tipo sanguíneo	Frequência	Freque relati
A	16	0,40
B	6	0,15
AB	3	0,075
O	15	0,375
total	40	1,00

2.8.7) Frequência de alunos
Dados:
. total de alunos = 80
grau B = 70%
. grau C = 5%
. grau A = ?

grau B
$80 \times \frac{70}{100} = 56$ alunos

grau C
$80 \times \frac{5}{100} = 4$

grau A
$80 - (56 + 4) = 20$

grau A contem 20.

2.8.8) Não tinha hábitos de - 615
sucção ou polegar - 190
uso de chupeta : 588
uso de mamadeira : 618
$N = 615 + 190 + 588 + 618$
$= 2011.$

$$fr = \frac{f}{N}$$

$$fr = \frac{615}{2011} = 0,3058$$

$$fr = \frac{190}{2011} = 0,0945$$

$$fr = \frac{588}{2011} = 0,2924$$

$$fr = \frac{618}{2011} = 0,3073$$

Categoria	F	Fr
sem hábito de sucção	615	0,3058
sucção ou polegar	190	0,0945
Chupeta	588	0,2924
mamadeira	618	0,3073