
Grupo de Causas	Frequência Absoluta (f_i)	Frequência em milhares
Doenças do aparelho circulatório	285.502	285,5 mil
Demais causas	163.962	164,0 mil
Neoplasia (tumores)	140.789	140,8 mil
Causas externas	127.399	127,4 mil
Doenças do aparelho respiratório	102.154	102,2 mil
Doenças infecciosas e parasitárias	46.052	46,1 mil
Algumas doenças originadas no período perinatal	30.695	30,7 mil
Total	896.002	896,0 mil



3.5.7:


Variável: Idade (em anos) de $n = 290$ pacientes com carcinoma epidermóide de boca e orofaringe

Intervalo de classe: Amplitude igual de h = 10 anos

Frequência Absoluta (fi)	Frequência Absoluta (fi)	Percentagem (%)
30 ⊢ 40	10	3,45%
40 ⊢ 50	66	22,76%
50 ⊢ 60	119	41,03%
60 ⊢ 70	66	22,76%
70 ⊢ 80	24	8,28%
80 ⊢ 90	5	1,72%
total	290	100,00%

Parâmetros do Gráfico

- Eixa x (Horizontal): Os limites das classes de idade (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
- Eixa y (Vertical): frequência absoluta / Nº de pacientes (fi), graduada de 0 a 120
- Regra: Retângulos contíguos (juntos) com alturas de 10, 66, 119, 66, 24 e 5.



3.5.8º tabela de Dados

-Variável: órgãos doados e a respetiva taxa de Aproveitamento (%)


-Data teórica de Exame: Como as taxas medem o rendimento relativo de cada órgão e o total não soma 100%, a gráfica de barras horizontais é a representação adequada.

Órgão ~~taxa~~	taxa de Aproveitamento
Rins	200,0%
Coração	42,9%
Fígado	19,1%
Pulmões	16,2%

Parâmetros de construção do Gráfico

-Eixo y (vertical) categorias (órgãos Rins, coração, Fígado Pulmões)
-Eixo x (horizontal): Taxa de Aproveitamento em percentagem (%) com escala graduada de 0% a 200%

Gráfica de representação do exercício 2.8.1?



3.5.9º

Organização dos dados (ROL)

Primeira ordenar os 30 valores de pressão arterial diastólica (PA) em ordem crescente:

64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 85, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 96

Calcula da amplitude e amplitude


- Valor mínimo = 64 - Amplitude total (AT) = 96 - 64 = 32
- Valor máximo = 96 - Número de classe (K): $\sqrt{30} \approx 5,47 \rightarrow 6$ classes
- Amplitude do intervalo de classe (h): $\frac{32}{6} = 5,33 \rightarrow h = 6$

Classes (mmHg)	Ponto médio (PM)	Frequência f(x)	Frequência Relativa (fr)	Porcentagem (%)
64 ⊢ 70	67	3	0,10	10%
70 ⊢ 76	73	5	0,17	17%
76 ⊢ 82	79	8	0,27	27%
82 ⊢ 88	85	10	0,33	33%
88 ⊢ 94	91	3	0,10	10%
94 ⊢ 100	97	1	0,03	3%
total		30	1,00	100%

Histograma

- Eixo x (horizontal): marcas os limites dos intervalos (64, 70, 76, 82, 88, 94, 100).
- Eixo y (vertical): marcas as frequências de 0 a 10
- As barras devem ficar juntas umas das outras (sem espaço)

Histograma da Pressão arterial diastólica



3.5.10

Tabela de distribuição de Frequencia (com Pontos Médios)

classes (mmHg)	Ponto Médio (PMi)	Frequencia (fi)
64 ⊢ 70	67	3
70 ⊢ 76	73	5
76 ⊢ 82	79	8
82 ⊢ 86	85	10
86 ⊢ 94	91	3
94 ⊢ 100	97	1
total	——	30

Regras fundamental para a poligonal de frequencias

Para fechar o poligono no eixo horizontal (x), dicionam-se:

- Uma classe ficticia antes da primeira (com PM = 61 e fi = 0)
- Uma classe ficticia depois da ultima (com PM = 103 e fi = 0).

Os pontos (x, y) a marcar no gráfico são:

(61; 0) → (67; 3) → (73; 5) → (79; 8) → (85; 10) → (91; 3) → (97; 1) → (103; 0)

