2.8).1 - Especifique o tipo das seguintes va
a) Quantitativa contínua
b) Qualitativa nominal
c) Quantitativa contínua
d) Quantitativa contínua
e) Qualitativa nominal
f) Quantitativa discreta
g) Quantitativa discreta
h) Quantitativa contínua

2.8).2 - Construção de tabela
852 pessoas entrevistadas
99 não tinham opinião e não foram consideradas
425 eram favoráveis
As restantes eram contrárias
Contrárias = 852 - 99 - 425
= 368 ,,
R: 368 pessoas eram contrárias

$$\text{Percentual} = \frac{F}{\text{Total}} \times 100$$

Para as pessoas favoráveis $= \frac{425}{852} \times 100 = 49,9\%$

Continuação 2.8) 2

Para os pessoas contrário(a)

$\frac{368}{852} \times 100 \approx 43,2\%$

Para os pessoas sem ou sem opinião

$\frac{59}{852} \times 100 \approx 6,9\%$

$\frac{59}{8,52}$

Tabela

Opinião	Frequência	Percentual
Favorável	425	49,9%
Contrário	368	43,2%
Não tem/não sabe	59	6,9%
Total	852	100%

2.8) 3 - Complete a tabela 2.18

200 alunos

Nota do aluno	Frequência	Frequen
De 9 á 10	16	0,08
De 8 á 9	36	0,18
De 6,5 á 7,8	90	0,45
De 5 à 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

Continuação de 2.8). 3

Formula $FR = \frac{F}{N}$ $F = FR \times N$

2.8.4 - Estádio da doença

Estágio da Doença	Frequência	Frequencia relativa
Leve	8	0,4
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1

2.8).5 - R: Os erros na distribuição de frequências são dois; primeiro não está definido se os valores iguais aos extremos das classes estão incluídos ou não e falta a classe de 50-60.

2.8).6 -

Tipos de Sangue	Frequência	Frequencia relativa
A	16	0,4
B	6	0,15
AB	3	0,075
O	15	0,375
Total	40	1

2.8) 7 -
80 alunos que fizeram curso de Estat:
70% receberam grau B
5% grau C
Grau A?
Total = 100%

Bec = 70% + 5% = 75%
100% - 75 = 25%

$FA = \frac{25 \times 80}{100}$

FA = 20 alunos

2.8) 8. Dados sobre crianças
615 . não tinham hábitos de sucção
190 . tinham o hábito de sucção do polegar
588 . usavam chupeta
618 . usavam mamadeira
N = 615 + 190 + 588 + 618
N = 2011

$FR = \frac{FA}{N}$

Continuação de 28) 8 Não tiveram Reforços

$$FR = \frac{615}{2011} = 0,305 \approx 0,306$$

$0,3058 \times 100 = 30,58\%$

Sucção do Refgor

FA = 190

N = 2011

$$FR = \frac{FA}{N} = \frac{190}{2011}$$

$= 0,0946$

$0,0946 \times 100 = 9,46\%$

Crianças que usavam chupeta

FA = 588

N = 2011

$$FR = \frac{588}{2011} = 0,2923$$

$0,2923 \times 100 = 29,23\%$

Crianças que usavam mamadeira

FA = 618

N = 2011

$$FR = \frac{618}{2011} = 0,3073$$

$0,3073 \times 100 = 30,73$

Continuação de 2.8).8.

Hábitos de sucção	FA	FR
Não tinham hábito	615	0,306
Sucção do polegar	190	0,0944
Chupeta	588	0,2923
Mamadeira	618	0,3073
Total	2011	1,00

2.8).9

Dados

Valor mínimo = 70 Kg

Valor máximo: 118 Kg

Número de classes = 10

Formula

$A = V_{máximo} - V_{mínimo}$

$IC = \frac{A}{K}$

$A = 118 - 70 = 48$

$A = 48$

$IC = \frac{48}{10} = 4,8 \approx 5$

R: Intervalo é 5.

Continuação de 2.8) 9

1 - 70 - 75
2 - 75 - 80
3 - 80 - 85
4 - 85 - 90
5 - 90 - 95
6 - 95 - 100
7 - 100 - 105
8 - 105 - 110
9 - 110 - 115
10 - 115 - 120

2.8) 10 -

1) Qual é o intervalo de classe?
R: O intervalo de classe é 5.

2) Qual é o intervalo de toda a distribuição?
R: O intervalo de toda a distribuição é 30

Rodas
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50

50 - 20 = 30

2.8) 11 - Organização dos dados

7, 8, 1, 7, 13, 6
12, 12, 3, 17, 4, 2
4, 15, 2, 14, 3, 5
10, 8, 9, 8, 5, 3
2, 7, 14, 12, 10, 8
1, 6, 4, 7, 7, 11

Ordem crescente

1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 17.

1 - 4
4 - 7
7 - 10
10 - 13
13 - 16
16 - 19

Dados do problema

Menor valor: 1
Maior valor: 17
Amplitude: 17 - 1 = 16
Número de classe: 6
Intervalo de classe: 16 ÷ 6 = 2,66 ≈ 3,,

classes (dias)	FA	FR
1 - 4	8	0,222
4 - 7	7	0,194
7 - 10	10	0,278
10 - 13	7	0,194
13 - 16	3	0,083
16 - 19	1	0,028
Total	36	

Continuação de 2.8) 11

Dias de intermomentos	FA
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
4 a 7 dias	12
8 a 14 dias	14
Mais de 14 dias	2
Total	36

2.8) 12

Conjunto A

Dados

n = 50

Valor mínimo: 24

Valor máximo: 70

$K = \sqrt{50} \simeq 7,1$

$A = 70 - 24 = 46$

$IC = \frac{46}{7} = 6,6 \simeq 7$

Classes A

24 - 31 | 31 - 38 | 38 - 45 | 45 - 52 | 52 - 59

59 - 66 | 66 - 73 |

Conjunto B

n = 100

mínimo 187

máximo = 821

$K = \sqrt{100} = 10$

$A = 821 - 187 = 634$

$IC = \frac{634}{10} = 63,45 = 65$

Classe B - 185 - 250 | 250 - 315 | 315 - 380 |

380 - 445 | 445 - 510 | 510 - 575 | 575 - 640 |

Continuación de 2.8) 12

Conjunto B

1640 - 7051

705 - 7701

770 - 8351

2.8) 13

Sodas

Zona	Alfabetización	No alfabetizado
Urbana	15	80
Rural	70	35
Total	85	

Urbana

15 + 80 = 85

Rural

70 + 35 = 105

Total = 85 + 105 = 200

$$\text{Porcentual} = \frac{F}{\text{Total}} \times 100$$

Urbana $\frac{15}{85} \times 100 = 15,8\%$

Rural $\frac{70}{105} \times 100 = 66,7\%$

Total $= \frac{85}{200} \times 100 = 42,5\%$

Continuação de 2.2.13

Zona de moradia	Abandono do trat
Urbana	15,8%
Rural	66,7%
Total	42,5%

R: O abandono do tratamento foi maior na zona rural do que na zona urbana.

2.8) 100

Dados

Dentistas total: 100

"Sim" 78

"Não" 100-78=22

Prevenção	FA	Percentual
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

Cálculo

Sim → $\frac{78}{100} \times 100 = 78\%$

Não → $\frac{22}{100} \times 100 = 22\%$

continuação de 2.8) 14

os dados mostram que os dentistas adota a prática da prevenção?

R.: Sim, a maior parte dos dentistas adota métodos de prevenção.

2.8) 15

Fórmula

$$FR(\%) = \frac{FA}{Total} \times 100$$

Grupos de Causas	Masculino	Feminino
Grupos doenças infecciosas e parasitárias	5,2%	5,0%
Neoplasias	14,5%	17,3%
Doenças do aparelho circulatório	28,8%	36,2%
Doenças do aparelho respiratório	10,7%	12,4%
Afecções originadas no período perinatal	3,4%	3,5%
Causas externas	20,5%	5,4%
Demais causas definidas	16,9%	20,2%
Total	100%	

Continuação 2.8)15
Comentário: As doenças do aparelho circulatório foram a principal causa de óbito, representando 28,8% dos óbitos masculinos e 36,2% dos femininos.

2.8)16

10+66+119+66+24+5 = 290

$$FR(\%) = \frac{FA}{Total} \times 100$$

Faixa etária	FA	FR(%)
30 a 40	10	3,4%
40 a 50	66	22,8%
50 a 60	119	41,0%
60 a 70	66	22,8%
70 a 80	24	8,3%
80 e mais	5	1,7%
Total	290	100%

A faixa etária de 50 a 60 anos apresentou a maior frequência, com 119 pacientes, correspondendo a 41% do total.

2.8.17

Dados

Órgão	Nº de dados	Qtd. provável
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17

Fórmula

$$\%\text{provável} = \frac{\text{Órgão provável}}{\text{Total dados}} \times 100$$

Rim = 105 x 2 = 210

$$\frac{210}{210} \times 100 = 100\%$$

Coração = 105

$$\frac{45}{105} \times 100 = 42{,}86\%$$

Fígado = 105

$$\frac{20}{105} \times 100 = 19{,}05\%$$

Pulmões 105 x 2 = 210

$$\frac{17}{210} \times 100 = 8{,}10\%$$

Continuação 2.8)

	Taxa de aproveitamento
Região	100%
Rim	42,86%
Coração	18,05%
Fígado	8,10%
Pulmões	

3.5)

Ângulo = $\frac{FA}{Ftotal} \times 360°$

Leve: $\frac{8}{20} \times 360 = 144°$

$144 + 162 + 54 = 360°$

Moderado: $\frac{9}{20} \times 360 = 162°$

Severo $\frac{3}{20} \times 360° = 54°$

