Daniela Pereira N-259

28.1- Peso das pessoas - variável quantitativa contínua porque pode assumir valores decimais por ex 60,5 Kg

Marcas comerciais de uma mesma embalagem variável qualitativa nominal, porque são nomes de marcas

Temperatura das pessoas: variável quantitativa contínua, porque pode assumir valores como 36,5°

Quantidade anual de chuva em cidade de São Paulo: variável quantitativa contínua, porque pode ser medida em milímetros

Religião variável qualitativa nominal, porque representa categorias sem ordem

Número de dentes permanentes presentes numa criança variável quantitativa discreta, porque é contado em números inteiros

Número de bebês nascidos por numa maternidade variável quantitativa discreta porque se contam os bebês

Comprimento de cães - variável quantitativa contínua, porque pode assumir valores decimais

28.2.

Total de pessoas: 852

Sem opinião ou que não conhecem o assunto: 59

Favoráveis: 425

852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Frequência	Frequência relativa
Sem opinião não conhecem	59	6,92%
Favoráveis	425	49,88%
Total de pessoas	368	43,19%
Total	852	100

28.3

Tolumn 200

Fal = 0,08

F = 0,08 x 200 = 16

Nota do aluno	Frequencia	F. relat
De 9 a 10	16	0,08
de 8 a 8,9	36	0,18
de 6,5 a 7,9	90	0,45
de 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

28.4 Leve: 8 pacientes N = 8 + 9 + 3 = 20

Moderado: 9 pacientes

Severo 3 pacientes

Estagio	F	F_r
Leve	8	8/20 = 40%
moderado	9	9/20 = 45%
Severo	3	3/20 = 15%
Total	20	100%

2.8.5 Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais
6 erro da distribuição de frequencia
50 a 60.
Corrigida
20 - 30, 30 - 40, 40 - 50, 50 - 60, 60 - 70, 70 -

2.8.6 40 doadores
Cada Tipo de sangue
Tipo A - 16
Tipo B - 6
Tipo AB - 3
Tipo O - 15

Tipo de sangue	Fa	F relat.
A	16	16/40 = 40%
B	6	6/40 = 15%
AB	3	3/40 = 7,5%
O	15	15/40 = 37,5%
Total	40	100%

28.7 Total dos alunos 80

Grau B: 70%

Grau C: 5%

Grau A: restante

Grau A: ?

$100 - 70\% - 5\% = 25\%$

$F = \frac{25}{100} \times 80 = 20$

28.8

Não Tinham falta de pressão: 615

Sucção do folgar: 190

Apenas chupeta: 588

Apenas mamadeira 618

a)

$N = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011$

b) $F_r = \frac{F}{2011} \times 100$

Categoria	F_{ii}	F_r
Sem hábito de sucção	615	30,58%
Sucção de chupeta	190	9,45%
Sucção de polegar	588	29,24%
Chupeta + polegar	618	30,73%
Total	2011	100%

28.9 P varia 10 Kg e 118 Kg

A = ?

A = 118 - 10 = 48 Kg

h = $\frac{48}{10}$ = 4,8 Kg

5 Kg

1 - 70 - 75 Kg

2 - 75 - 80 Kg

3 - 80 - 85 Kg

4 - 85 - 90 Kg

5 - 90 - 95 Kg

6 - 95 - 100 Kg

7 - 100 - 105 Kg

8 - 105 - 110 Kg

9 - 110 - 115 Kg

10 115 - 120 Kg

Estes dados permitem agrupar todos os pesos entre 10 Kg e 118 Kg

2.8.10 - 20 ⊢ 25, 25 ⊢ 30, 30 ⊢ 35, 35 ⊢ 40
40 ⊢ 45, 45 ⊢ 50

a) Intervalo de classe
h = 25 - 20 = 5

b) Amplitude total da distribuição
A = 50 - 20 = 30

2.8.11 1,2; 2,3; 3,2; 4,3; 5,2; 6,2
7,5; 8,4
ordem: 9,1; 10,2; 11,1; 12,3; 13,1; 14,2
15,1; 11,1; 17,1
Ampl h = 3

Tempo de internação	Folgas
1 ⊢ 4	8
4 ⊢ 7	7
7 ⊢ 10	10
10 ⊢ 13	6
13 ⊢ 16	4
16 ⊢ 19	1
Total	36

2.8.12 n = 50

Valor mínimo: 24

Valor máximo 70

A:?

A = 70 - 24 = 46

Calcul $K = 1 + 3,3,22 \log(50)$

$K = 7$

h:? $h = \frac{46}{7} \approx 6,57 \approx 7$

Conjunto B

n = 100

Valor mínimo = 187

Valor máximo 821

A:? $A = 821 - 187 = 634$

K:?

$K = 1 + 3,3,22 \log(100.) \approx 8$

h:?

$h = \frac{634}{8} = 79,25 \approx 80$

Percentagem de abandono do Tno de Tu

2.8.19 Zona urbana: 15 abandonaram e 80 não abandonaram

Zona rural: 10 abandonaram e 35 não abandonaram

% de abandono = Abandonaram x 100
Tot. da zona

Zona urbana

Total:

15 + 80 = 95

Percent de abond

15/95 x 100 = 15,79%

Zona rural

Total: 70 + 35 = 105

Percen de abandono

10/105 x 100 = 66,67%

A taxa de abandono é 15,79% na zona urbana e de 66,67% na zona rural, a zona rural apresenta uma percentagem de abandono muito superior à da zona urbana

2.8.14 Foram questionados 100 donos
. 18 responderam sim
. 65 restantes responderam não

F dos que resp não
100 - 78 = 22

Resposta	F	F%
Sim	18	18%
Não	22	22%
Total	100	100%

2.8.15 a) Total mensal

2.8.15 b) Total masculino
27,437 + 16,065 + 150,387 + 55,785
+ 17,530 + 101,032 + 88,569 = 522,795 dl

Feminino
18,615 + 64,724 + 135,119 + 46,369
+ 13,724 + 20,368 + 75,399 = 373,759 dl

c) $\frac{27,437}{522,795} \times 100 = 5,25\%$

Grupo de causas	masculino	Feminino
Doenças infecciosas e parasitárias	5,25%	4,98%
Neoplasias	14,55%	17,32%
Doenças do aparelho circulatório	28,77%	36,75%
Doenças do aparelho respiratório	10,67%	12,41%
Afecções originadas no período perinatal	3,35%	3,52%
Causas externas	20,47%	5,95%
Demais causas definidas	16,94%	20,17%
Total	100%	100

2.8.16 Calcular o Total

N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 = 290

$$F_r = \frac{F}{290} \times 100$$

Faixa etária	Número de pacientes	Fr
	10	3,45%
30 ⊢ 40 anos	66	22,76%
40 ⊢ 50 anos	119	41,03%
50 ⊢ 60 anos	66	22,76%
60 ⊢ 70 anos	24	8,28%
80 anos ou mais	290	100%
TOT		

A faixa etária com mais frequências de casos é a de 50 a 60, com 119 pacientes que corresponde a ≈ 41,03% do total.

2.8.17 ∞ Percen = $\frac{\text{orgão observado} \times 100}{\text{Número de doadores}}$

1. Rim

$\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

2- Coração

$\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

3- Fígado

$\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

Pulmão

$\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$

Órgão	Número de doadores	Órgão efetivado	Percentagem
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmão	105	17	16,19%