2.8.1)

a) Peso de pessoa => Quantitativa contínua

b) Setores Comerciais de um mesmo analgésico => Qualitativa nominal

c) Temperatura de pessoa => Quantitativa contínua

d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo => Quantitativa contínua

e) Religião => Qualitativa nominal

f) Número de dentes permanentes inclusos em uma criança => Quantitativa discreta

g) Número de bebês nascidos por dia em uma maternidade => Quantitativa discreta

2.8.)

b) Comprimento de cães -> Quantitativa contínua.

2.8.2

Pessoas entrevistadas	Fi	Fri(%)	Fiac	Friac
Não finalizaram	59	6,924%	59	6,924%
Com baixáveis	425	49,882%	484	56,807%
Com contraditórios	368	43,195%	852	100%
Total	852	100%	—	—

2.8.3

Peso do aluno	Frequência	Frequência Relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$F_{i\ 6\ 9\ a\ 10} = m + \sum F_i = 200$

$= 26$

$Fri = \frac{Fi}{m} \times 100$

(B) $Fri = \frac{Fi}{m} \times 100$

2.8.4

(A)

Classificação da doença	Frequência Absoluta	Frequência Relativa (%)
Leve	8	40%
Moderada	9	45%
Grave	3	15%
Total	20	100%

2.8.5 R:

2.15 R: O primeiro deve ser distribuição de frequências apresentada é a falta de especificidade. Observa-se a ausência da classe de 50|-60, o que cria descontinuidade na sequência e impossibilita a classificação de valores pertencentes a esse intervalo como foi exemplo 55. Além disso, há um segundo erro: a última classe apresenta-se como aberta (70 e mais). Considerando que a amplitude é de 10, o ideal seria manter o mesmo padrão e fechá-la, garantindo assim padronização e permitindo o cálculo correto das medidas estatísticas.

28.6

Tipo de sangue	Fi	Fri (%)	Foc	Froc
A	16	40%	16	40%
B	6	15%	22	55%
AB	3	7,5%	25	62,5%
O	15	37,5%	40	100%
Total	40	100%	...	...

28.7

Total de alunos	Frequência absoluta	Frequência relativa (%)
A	20	25%
B	56	70%
C	4	5%
Total	80	100%

$F_{ri_A} = 100\% - (70\% + 5\%) = 25\%$

$F_{i_A} = \frac{80}{x} \quad \frac{100\%}{25\%} \Rightarrow x = 20$

$F_{i_B} = \frac{80}{x} \quad \frac{100\%}{70\%} \Rightarrow x = 56$

$F_{i_C} = \frac{80}{x} \quad \frac{100\%}{5\%} \Rightarrow x = 4$

2.8.8

Características das crianças analisadas	F_i	$F_{ri}(\%)$	f_{ac}	f_{rac}
Não tem hábito de sucção	615	30,58%	615	30,58%
Tem hábito de sucção	190	9,44%	805	40,02%
Tem hábito de sucção	588	29,23%	1393	69,26%
Usam chupeta	618	30,74%	2011	100%
Usam mamadeira	2011	100%		
Total				

2.8.9 $h = \frac{x(max) - x(min)}{K} = \frac{118-70}{10} = 4,8 \approx 5$

K=10

Classes
70 | — 75
75 | — 80
80 | — 85
85 | — 90
90 | — 95
100 | — 105

Continuação...
105 | — 110
110 | — 115
115 | — 120

2.8.)

Dados

$K = 1 + 3.322 \cdot \log(m)$ | $m = 36$

$1 + 3,322 \cdot \log(36)$ | $x_{máx} = 17$

$6,17 \approx 6$ | $x_{mínm} = 1$

$b = \frac{x_{máx} - x_{mínm}}{K} = \frac{17 - 1}{6} = 2,666 \approx 3$

2.8.11

Class	Fi	Fri (%)	Fiac	Friac (%)
1 — 4	8	22,2222%	8	22,2222%
4 — 7	7	19,4444%	15	41,6666%
7 — 10	10	27,7778%	25	69,4444%
10 — 13	6	16,6667%	31	86,1111%
13 — 16	4	11,1111%	35	97,2222%
16 — 19	1	2,7778%	36	100%
Total		100%	—	

Intervalo	Fi	Fri (%)	Fiac	Friac
1 dia	2	6,5%	2	6,5%
2 ou 3 dias	6	19,4%	8	25,9%
4 — 7 dias	7	22,6%	15	48,5%
8 — 11 dias	12	38,6%	27	87,1%
11 — mais	4	12,9%	31	100%
Total	31	100%		

28.10 B) O intervalo de classe e de toda a distribuição é 5.

2.8.12

Todos Conjunto A
$n = 50$
$x_{mín} = 24$
$x_{máx} = 70$

Conjunto B
$n = 100$
$x_{mín} = 187$
$x_{máx} = 821$

Fórmulas
$h = \frac{x_{máx} - x_{mín}}{k}$
$k = 1 + 3{,}322 \cdot \log(n)$

$k_A = 1 + 3{,}322 \cdot \log(50)$
$= 6{,}6 \approx 7$

$h_A = \frac{70 - 24}{7}$

$= 6{,}57 \approx 7$

$k_B = 1 + 3{,}322 \cdot \log(100)$
$= 7{,}6 \approx 8$

$h_B = \frac{821 - 187}{8}$

$= 79{,}25 \approx 80$

2.8.13

Zona Urbana	Fi	Fri (%)
Sim	15	15,7895%
Não	80	84,2105%
Total	95	100%

Zona Rural	Fi	Fri (%)
Sim	70	66,6667%
Não	35	33,3333%
Total	105	100%

R: Da zona urbana 15,7895% da população abandonaram o tratamento de tuberculose e na zona rural 66,6667%, totalizando 82,4562% da população em geral abandonaram o tratamento.

2.8.14.

Respostas	Fi	Fri (%)
Sim	78	78 % ou 0,78
Não	22	22 % ou 0,22
Total	100	100 % ou 1

2. Discussão dos Resultados

R. Os dados demonstram que a maioria esmagadora dos profissionais entrevistados (78%), adota a prática clínica de Capsulotomia a enfatização do método preventivo de cáries e doenças gengivais.

2015

Capítulo	Fi masculino	Fri (%) masculino	Fi Feminino	Fri Feminino
Doenças infecciosas	27.437	5,25%	18.615	4,98%
Neoplasias	76.065	14,55%	64.724	17,32%
Doenças do aparelho circulatório	150.383	28,77%	135.119	36,15%
Doenças do aparelho respiratório	55.785	10,67%	46.369	12,41%
Afecções originadas no período perinatal	17.530	3,35%	13.165	3,52%
Causas externas	107.032	20,47%	20.368	5,45%
Demais causas definidas	88.563	16,94%	75.399	20,17%
Total	522.795	100%	373.759	100%

2.15. O que a tabela mostra?

1º) A principal causa de morte é a mesma nos ambos sexos (doenças do aparelho circulatório é a 1ª causa de morte tanto nos homens (28,77%), quanto nas mulheres (36,15%)). Sendo que doenças crônicas representam o maior problema de saúde pública da população brasileira.

2º) Os homens são mais vulneráveis a causas externas (acidentes de trânsito, homicídios entre outros), em relação as mulheres, pois para os homens representam a 2ª causa de morte (20,47%) e para as mulheres representam a 5ª causa de morte (5,45%).

3º) As duas faixas representam a 3ª causa nas mulheres (17,32%) e a 4ª causa (14,55%) nos homens.

4º) Há a mais alta do sexo masculino em relação ao feminino.

2.8.16

Faixa etária	Fi Números	Fri (%)
30 ⊢ 40	10	3,4483%
40 ⊢ 50	66	22,7586%
50 ⊢ 60	119	41,0345%
60 ⊢ 70	66	22,7586%
70 ⊢ 80	24	8,2759%
80 ⊢ mais	5	1,7241%
Total	290	100%

R: A faixa etária de maior risco é a 50⊢60.

2.8.17

Origão	Frequência absoluta Nº de doadores	Nº de órgãos aproveitados	Frequência relativa
Rim	105	210	50%
Coração	105	45	10,7142%
Fígado	105	20	4,7190%
Pulmões	105	17	4,0476%