2.8.1) R: Quantitativo discreto | Quantitativo Contínuo
Quantitativo nominal | Quantitativo ordenal

Alíneas	Variável	Classificação	Justificação
a)	Peso de Pessoas	Quantitativo contínuo	É uma medida ex: 60,5kg
b)	Marcas comerciais de um mesmo analgésico	Quantitativo nominal	São categorias de marca sem ordem
c)	Temperatura de Pessoas	Quantitativo contínuo	Medida de valores decimais
d)	Quantidade anual de chuva em São Paulo	Quantitativo contínua	É uma medida Ex: Milímetros
e)	Religião	Quantitativo nominal	São categorias sem ordem natural
f)	Número de dentes irrompidos numa criança	Quantitativa discreta	É uma contagem de dentes
g)	Número de Bebés nascidos por dia numa maternidade	Quantitativo discreta	É contagem de bebés
h)	Comprimento de [illegible]	Quantitativo contínuo	É medida de comprimento

2.8.2)
Total: 852 pessoas
Sem opinião: 59
Favoráveis: 425

$F_{contrários} = T_p - Sem\ opinião - Favoráveis$

$F_c = 852 - 59 - 425$

$F_c = 368$

Opinião	Frequência absoluta	F_r	Percentagem
Favoráveis	425	0,4988	49,88%
Contrários	368	0,4319	43,19%
Sem opinião	59	0,0692	6,92%
Total	852	1,0000	

$F_n = \frac{59}{852} = 0,06$

$F_r = \frac{f_i}{n}$: $F_n = \frac{425}{852} = 0,4988$ $F_n = \frac{368}{852} = 0,4315$

2.8.13 Seguinte dados:

Taxa de abandono = $\frac{\text{eliminados}}{\text{Total da zona}} \times 100$

zona de moradia	Abandono de tratamento Sim	Não	Total
Urbano	15	80	95
Rural	70	35	105

a) Zona Urbano $\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$



b) Zona Rural $\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

R: Na zona Urbano a Taxa de abandono é de 15,79% enquanto que na zona rural é de 66,67%. A maioria de abando na zona rural é mas elevado 66,67%.

2.8.14 - Calcular a frequência dos que responderam "não"

100 dentistas

78 responderam "então"

$F_{não} = 100 - 78$

$F_n = 22$

Resposta	Fi	Fri	Percentagem
1 Sim	78	0,78	78%
Não	22	0,22	22%
Total			100%

$F_n = \frac{78}{100} = 0,78$ $F_n = \frac{22}{100} = 0,22$

Classe	Intervalo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Classe	Intervalo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Sucção de crianças entre 3 a 6 anos
Sem hábito de sucção: 615
sucção de polegar: 190
Utilizaram chupeta: 588
Utilizaram mamadeira: 618


= 615 + 190 + 588 + 618
= 2011

Frequência relativa e os ângulos

Hábito	Fi	Percentagem	Ângulo
sem Hábito de sucção	615	30,58%	110,08°
sucção de polegar	190	9,45%	34,01°
chupeta	588	29,24%	34,01°
Mamadeira.	618	30,73%	105,20°
~~Total~~	2011	100%	110,71°
			360°

- Histograma das pressão diastólicas

Frequência absoluto das seis classes



2.8.3 Para 9 a 10 a frequência relativa é 0,08

$Fa = \frac{fa}{N}$

$Fi = Fa \times N$

$Fi = 0,08 \times 200 = 16$

2.8.5

Classe

1 - 20 - 30

2 - 30 - 40

3 - 40 - 50

4 - 60 - 70

5 - 70 a mais

6 -

O erro são em classe 50 - 60 e 60 - 7 ouve uma interrupção

20 - 30

O ideal seria 30 - 40

Sem alterar. 40 - 50

50 - 60

60 - 70

70 a mais

2.8.6 R: Os tipos sanguíneos são 4 tipos - As ocorrências dos dados fornecidos de cada tipo são:

Tipo A = 16

Tipo B = 6

Tipo AB = 3


Tipo O = 15

16 + 6 + 3 + 15 = 40 Total = 40

Tipo sanguíneo	Fi	Fri	Percentagem
A	16		

3-5-6 O valor mínimo é 1 dia e máximo 17
A 17 - 1 = 16

* Gráfico de Barras Longitudinais



3.5.7) eV = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5
eV: 290

Faixa etária	Frequência	Frequência relativa
30 - 40	10	3,45
40 - 50	66	22,76
50 - 60	119	41,03
60 - 70	66	22,76
70 - 80	24	8,28
80 a mais	5	1,72
Total	290	100%

Fr = 10 / 290 × 100 = 3,448 ≈ 3,45

3.5.10 - Calcular o ponto médio

$$xi = \frac{Lim\ inf + Lim\ sup}{2} \qquad xi = \frac{64 + 69}{2} = 66,5$$

4.6.3 - Qual medida corresponde sempre a um valor do conjunto?
R: A média que corresponde sempre a um valor observado no conjunto é a moda.