2.88.1 Tipos de variáveis

a. Peso de pessoas: quantitativa contínua

b. Marca de cerveja mais consumida: qualitativa nominal

c. Temperatura de pessoas: quantitativa contínua

d. Quantidade de chuva na cidade de São Paulo: quantitativa contínua

e. Religião: qualitativa nominal

f. Número de acertos em um concurso público: quantitativa discreta

g. Número de bebês nascidos em uma maternidade: quantitativa discreta

h. Comprimento de cabelo: quantitativa contínua

2.8.2 - Tabela de distribuição

Foram entrevistadas 852 pessoas, dessas 59 não tinham opinião ou não comentaram o assunto e 425 com boa notícias.

Para calcular

852 - 59 - 425 = 368 Restantes

opinião	Frequência
Favoráveis	425
Contrárias	368
Sem opinião ou não comentaram	59
Total	852

2.83 - Completar a tabela 2.18 (total de 200 alunos).

Para calcular a frequência relativa, dividimos a frequência pelo total:

$Fn = \frac{F}{200}$ $Fa = \frac{b}{n}$

que nos mes multiplica,

$b = 0{,}8 \times 200 = 76$

Nota do exame	Frequencia	Frequencia relativa
de 9 a 10	76	0,08
de 8 a 8,9	36	0,18
de 6,5 a 7,9	90	0,45
de 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
TOTAL	200	1,00 (100%)

2. B. Registogias de lema doenco
os 20 pacientes foram classe
ficados em 3 estágios

Leve, moderado e severo

dados apresentados
a)
Leve: 6 pacientes
Moderado: 10 P
severo: 4 P

Estágio	Frequencia
Leve	6
Moderado	10
Severo	4
Total	20

b- Frequencia relativa
usamos Formula $Fr = \frac{6}{20}$

Estagio	Frequencia	Frequencia relativo
Leve	6	0,30

2.8.4 Frequencia de cada estágio da doença

a) Frequencia absoluta

Comtamos que em 20 vezes apareceu do estagio mes 20 pacientes

Leve: 8 P
Moderado: 9 P
Severo: 3 P

b Frequencia relativa

$$Fr = \frac{\text{Frequencia}}{\text{Total}}$$

Leve $\frac{8}{20} = 0,40$

Moderado $\frac{9}{20} = 0,45$

Severo $\frac{3}{20} = 0,15$

Estágio	Frequencia	Frequencia relativa
Bom	8	0,40
Moderado	9	0,45
Ruim	3	0,15
Total	20	1,00 (100%)

2.85

As classes dos períodos são

20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

Resposta: Como o que falta a classe 50 - 60. A distribuição apresenta uma interrupção entre 50 e 60. A sequencia correta será: 20 - 30 60 - 70
30 - 40 70 e mais
50 - 60

2.8.6
Frequ
ncias

as do
res.

Comon
observ
A = 76
B = 6
O =
AB =

Tipo d
sang
A

B

O

AB