2.8.6 - Tabla de distribución de frecuencias de grupos sanguíneos

Los dadores corresponden a 210 dadores.

Contando cada grupo sanguíneo obtenemos:

A = 76
B = 6
O = 15
AB = 3

$Fn = \frac{76}{210} = 0,120$ | 210 | 3 | 0,0175

$= \frac{6}{210} = 0,145$

$= \frac{15}{210} = 0,1375$

Tipo de sangre	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
A	76	0,120 (21%)
		0,145 (15%)
B	6	
O	15	0,1375 (3,75)
AB	3	0,0175 (1,5%)

2.8.7 Notas dos alunos

Dados
. Total de alunos: 80
Nota B: 70%
Nota C: 5%
. Os restantes obtiveram nota A.

Calcule

A = 100% - 70% - 5% = 25%

$$A = \frac{25\%}{100} \times 80 = 20$$

20 alunos obtiveram nota A

2.8.8 Hábitos de leitura das crianças

Dados
Não tinham hábitos de leitura 615
Responderam oralmente: 190
Responderam escrita 588
Responderam monomeia 618

q Co
N = 6
Cal
Fon
1
Tr

618
20

a) Calcular o total

N = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011

Calcular as frequências relativas

Formula

$$FR = \frac{\text{Frequência}}{\text{Total}}$$

$$FR = \frac{615}{2011} = 0,3058$$

$$\frac{190}{2011} = 0,0944$$

$$\frac{588}{2011} = 0,2923$$

$$\frac{618}{2011} = 0,3073$$

Hospito	Frequencia	Frequencia relativa
Sem Hospitais de Sucesso	615	30,58 %
Sucesso do Polígono	190	9,45 %
Uso de Reta	588	29,226%
Uso de momentânea	618	30,73%
Total	2011	100%

Total das Frequencias é 2011.

2.8.9 Peso dos bombeiros
Os pesos variam entre 40 kg e 118 kg
são no estudos 10 classes

1-Passo cal
AT = 118
2 Passo: Cal
class
$h = \frac{AT}{10}$
Pode-se a
classes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1-Passo calcular a amplitude total

AT = 118 - 70 = 48

2 Passo: Calcular a amplitude de cada classe

$$h = \frac{48}{10} = 4,8$$

Pode-se arredondar para 5 kg

classes	Intervalo de peso
1	70 - 75 kg
2	75 - 80 kg
3	80 - 85 kg
4	85 - 90 kg
5	90 - 95 kg
6	95 - 100 kg
7	100 - 105 kg
8	105 - 110 kg
9	110 - 115 kg
10	115 - 120 kg

2.8.10 Numero de 6 em 6 em 6 em meios

As classes dos dados são

20-25; 25-30; 30-35; 35-40;

40-45; 45-50.

9 intervalo de classe

20-25 : 5
30-25 : 5
35-30 : 5
40-35 : 5
45-40 : 5
50-45 : 5

c intervalo de classe é 5

5- Qual é o intervalo dos dados distribuição

AT = Maior limite - Menor limite

AT = 50 - 20

AT = 30

2.8.11 Tempo
pessoas

Existem 36 pe
numa loja

1 passo engo

1 a 3 dias
4 a 6 dias
7 a 9 dias
10 a 12 di
13 a 15 di
16 a 18

Passo 2 Co

Tempo di
1 - 3 dias
4 - 6 dias
7 - 9 dias
10 - 12 di
13 - 15 d
16 - 18

Total

2.8.1 Tempo de Internamento dos pacientes

Existem 36 Pacientes. Uns com as seguintes Patologias

1 Passo ongonigo os Intervalos

1 a 3 dias
4 a 6 dias
7 a 9 dias
10 a 12 dias
13 a 15 dias
16 a 18 dias

Passo 2 Contou quantos pacientes ficam em cada intervalo

Tempo de internamento	Frequencia
1 - 3 dias	8
4 - 6 dias	7
7 - 9 dias	10
10 - 12 dias	6
13 - 15 dias	4
16 - 18 dias	1
Total	36

b cas Intervalos já estão ordenados pelo exercício só preciso mostrar as posições que pertencem a cada grupo

Tempo de Internamento	Frequência
1 dia	2
2 ao 3 dias	6
4 a 7 dias	12
8 a 14 dias	14
Mais de 14 dias	2
Total	36

2+6+12+14+2 = 36

2.B. 12 Intervalo de Classes das confu
ntes A e B

$$K = 1 + 3{,}3 \log_{10}(n)$$

Conjunto A n=50 mínimo
21 máximo = 70

1 Passo - Amp
AT = 70 - 2

2 Passo Nu

K = 1 + 3,3

3 Passo A

h = 26 / 7

classe
1
2
3
4
5
6
7

Conjunto B
Dados: n

1 Passo - Amplitude total

AT = 70 - 24 = 46

2 Passo Numero de classes

$K = 1 + 3{,}3 \log_{10}(50) \approx 7$

3 Passo Amplitude de classes

$h = \frac{46}{7} \approx 6{,}57$

Arredonda 7

classe	intervalos
1	24-31
2	31-38
3	38-45
4	45-52
5	52-59
6	59-66
7	66-73

Conjunto B

Dados: n = 100 mínimo = 187 e máximo

mo 821

1.º passo - Amplitude total

$AT = 827 - 181 = 631$

2 Passo Número de classes

$K = 1 + 3{,}3 \log_{10}(100) = 7{,}6 \simeq 8$

3 Passo - Amplitude do classes

$$h = \frac{631}{8} \simeq 79{,}25$$

Arredondando para 80

classes	Intervalle
1	187 — 267
2	267 — 347
3	347 — 427
4	427 — 507
5	507 — 587
6	587 — 667
7	667 — 747
8	747 — 827