6	581 - 667
7	667 - 747
8	747 - 827

2.8.13 Porcentual de observados

Abormula:

$$\text{Porcentaje observado} = \frac{\text{Abs}}{\text{Total}} \times 100$$

Suma positiva
Total de Positivos

15+80=95

Tasa de observados

$$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$$

Zona rural
Total de Pacientes 70+35=105

Taxa de abandono
$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

Zona de moradia	Abandonou com	Não Abando	Total	Taxa de abandono
Urbana	15	80	95	15,79%
Rural	70	35	105	66,67%
Total	85	175	260	212,5%

Observa-se que a probabilidade maior é na zona rural, com 66,67% contra 15,79% na zona urbana.

2.8.12
Descrição

Dados
Total
Respondeu
Os resta

Calculo

Respostas
Sim
Não
Total

Conclusão
maioria
Pacientes
Abandonou
consulta

2.8.15 Fa

Fr =

2.8.14 Pesquisa de opiniões pelos dados

dados
Total de pessoas: 100
Responderam "Sim" 78
Os restantes responderam não

Calculo 100 - 78 = 22

Resposta	Frequencia	Frequencia relativa
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

Conclusão os dados mostram que a maioria dos pessoas está a favor do projecto, pois 78% dos pessoas apoiam, enquanto que 22% são contra.

2.8.15 Frequencia relativa dos dados

$$FR = \frac{\text{Frequencia da coisa} \times 100}{\text{Total dos dados}}$$

Os totais são:

Masculino: 522.795 óbitos
Femininos 373.759 óbitos

Grupos de causas	Masculino (%)	Feminino
DIP	5,25%	21,98%
Neoplasias	11,55%	17,32%
Doenças do aparelho circulatório	18,17%	36,15%
Doenças do aparelho respiratório	10,67%	12,24%
A. Infecciosas	3,35%	3,52%
Causas externas	20,21%	5,25%
Demais causas definidas	16,94%	20,77%
Total geral	100%	100%

2.8.16 Terça

A Foi amul

FR = Fx 9

1-passo: S

10+66+11

Total do

2 Passo ca
de cada Fai

Faixa etária
30-210
210-50
50-60
60-70
70-80
80 e mais
Total

2.8.16 Frequencia Relativa

A Formula:

$$FR = \frac{\text{Frequencia absoluta}}{\text{total}} \times 100$$

1-passo: Somar todos os pacientes

10+66+119+66+22+5 = 290

Total dos Pacientes 290

2 Passo calcula Frequencia relativa de cada Faixa etaria

Faixa etaria	Nu de Pacientes	Calculo	Frequencia relativa
30-20	10	10 ×100 / 290	3,45
20-50	66	66 ÷ 290 x 100	22,76
50-60	119	119 ÷ 290 x 100	41,03
60-70	66	66 ÷ 290 x 100	22,76
70-80	24	22 ÷ 290 x 100	3,28
80 ou mais	5	5 : 290 x 100	1,72
Total	290		100%

3. Passo 3 identificar a faixa etária do maior risco

A faixa etária de 50 a 60 anos tem 119 pacientes, o mesmo pode ser aproximadamente 21,03 %

A faixa etária com maior número de pacientes é de 50 a 60 anos

2.8.11 Percentual em órgãos específicos

P = $\frac{G \cdot A}{N \text{ de dados}}$ x 100

Na tabela 105 dados para cada órgão

105 dados para cada órgão

Rim P = $\frac{210}{105}$ x 100 = 200%

Coração P = $\frac{215}{105}$ x 100 = 212,86%

Tabela Órgãos

Rins

Coração

3.5 10

1-

6 11. 1

20.80

3 3.3

96.

Nº zigodo $= \frac{20}{105} \times 100 = \boxed{19,05\%}$

Rulmões $= \frac{17}{105} \times 100 = \boxed{16,19\%}$

Tabela	Dados	Cargos oferecidos	Percentual
Cargo	105	210	200%
Ruim	105	215	212,86%
Coroa	105	20	19,05%
Zigodo	105	17	16,19%
Rulmões	105		

Quinze oferecem 20 de porque tonam oferecidos 210 vinte e 15 dos dados nos, cargo, dez vinte pois dados com cargo

3,5 10