
3.5.1 ⇒ leve : 8
moderado : 9
severo = 3

$FR = \frac{f}{N} \times 100$

Estado	frequência	percentagem
leve	8	40 %
moderado	9	45 %
severo	3	15 %
Total	20	100 %

3.5.2

GRUPO Sanguíneo	Frequencia	Percentagem
A	16	40 %
O	15	37,5 %
B	6	15 %
AB	3	7,5 %
Total	40	100 %




3.5.3 ⇒

Hábitos	f	Percentagem %
Sem Hábitos	615	30,58 %
Sucção do polega	190	9,45 %
chupeta	588	29,24 %
mamadeira	618	30,73 %
total	2011	100 %

mamadeira apresenta maior frequencia com 30,73 %
sucção do polegar apresenta menor frequencia 9,45 %

3.5.4



3.5.5

Zona URBANA

total: 15 + 80 = 95

Abandono	f	%
Sim	15	15,79 %
Não	80	84,21 %
total	95	100 %

Não	Sim
>	<

Sim	Não
15	80

Zona Rural

Abandono	F	%
Sim	70	66,67 %
Não	35	33,33 %
total	105	100 %

Não	Sim
<	>

Sim	Não
70	35


3.5.6 ⇒ Masculino - 522,795 obitos
Feminino - 373,759 obitos
↳ Total

$$F_R = \frac{f}{N} \times 100$$


Causas	Masculino (%)	Feminino %
Infecciosas e Parasitarias	5,25 %	4,98 %
Neoplasias	14,55 %	17,32 %
Doenças do aparelho circulatorio	28,77 %	36,15 %
Doenças do aparelho Respiratorio	10,67 %	12,41 %
Afecções do periodo Perinatal	3,35 %	3,52 %
Causas externas	20,47 %	5,46 %
Demais causas	16,94 %	20,17 %
total	100 %	100 %

3.5.7 $N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5 = 290$ *

$N = 290$



3.5.8 - Grafico de Barras $TA = \frac{\text{órgãos aproveitados}}{\text{órgãos disponiveis}} \times 100$




3.5.9 ⇒ nº de observações: N=30

Valor mínimo: 64

Valor máximo: 96

Amplitude total = ? At = 96 − 64 = 32



3.5.10 ⇒

Ponto médio (xi)	Frequência (fi)
66,5	1
72,5	5
78,5	8
84,5	10
90,5	5
96,5	1

