

3.5.1




A maior parte dos pacientes apresenta doença em estágio moderado que corresponde a 45%, seguida do estágio leve com 40%. e por último o estágio severo que representa cerca de 15%.

3.5.2




O tipo sanguíneo A apresenta o maior número de doadores (16), enquanto o tipo AB apresenta o menor número (3)

3.5.3



O habito mais frequente é a sucção da mamadeira (30,7% enquanto a sucção do polegar é a menos frequente.


3.5.4




O intervalo de 6⊢9 dias apresenta a maior frequencia com 11 pacientes.

3.5.5

Zona urbana




Zona rural




Valandono do tratamento é mais frequente na zona rural (66,7%) do que na zona urbana com 15,8%.

3.5.6




Assim doenças do aparelho circulatório são a principal causa de obitos nos dois sexos. e as causas externas são muito maiores nos homens.

3.5.7



A faixa dos 50⊢60 anos apresenta maior frequência com 119 pacientes correspondendo a cerca de 41%.

3.5.8



Os rins apresentam a maior taxa de aproveitamento e os pulmões a menor.


3.5.9

Ordenação


64	70	72	73	74	75
77	78	79	79	80	80
81	81	82	82	82	83
83	86	87	87	88	90
91	92	96			

79

82



3.5.10



4.6.1 a) Determine média, mediana e moda dos seguintes conjuntos de dados

a) 8; 3; 0; 6; 8

Média $\frac{(8+3+0+6+8)}{5}$ $\frac{25}{5} = 5$

Média = 5

Mediana = 6

Moda = 8

b) 8; 16; 2; 8; 6 (2, 6, 8, 8, 16)

Média $\frac{(8+16+2+8+6)}{5}$ $\frac{40}{5} = 8$

Média = 5

Mediana = 8

Moda = 8

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10 (4, 6, 10, 10, 16, 20)

Média $\frac{(4+16+10+6+20+10)}{6} = \frac{66}{6}$

66 6

Mediana (10+10) : 2 = 10 / Moda 10

d) 0; -2; 3; -1; 5

Média $\frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Mediana: 0

Moda: nenhum valor repete.