3.5.1. Gráfico de setores - desenhar


calcular os ângulos dos setores:

Ângulo $= \frac{Fi}{N} \times 360°$

Leve: $\frac{8}{20} \times 360^\circ = 144^\circ$

Moderado: $\frac{9}{20} \times 360^\circ = 162^\circ$

Severo: $\frac{3}{20} \times 360^\circ = 54^\circ$




Leve
8

Moderado
9

Severo
3

Distribuição de 20 pacientes por estágio da doença

3.5.2



Número de doadores por tipo sanguíneo, num total de 40

3.5.3 Calcular os ângulos dos setores:


Sem hábito de sucção: $\frac{615}{2011} \times 360^\circ \approx 110^\circ$

Sucção do polegar: $\frac{190}{2011} \times 360^\circ \approx 34^\circ$

Chupeta: $\frac{588}{2011} \times 360^\circ \approx 105^\circ$


Mamadeira: $\frac{618}{2011} \times 360^\circ \approx 111^\circ$

Distribuição de 2011 crianças segundo os hábitos de sucção



- Mamadeira (618)
- Sem hábito de sucção (6
- Chupeta (588)
- Polegar (190)

3.5.4.



Histograma aproximado das frequências dos 36 pacientes agrupados em classe.

3.5.5. Gráfico de setores - zona urbana


Calculos os ângulos:

Sim: $\frac{15}{95} \times 360^\circ \simeq 57^\circ$

Não: $\frac{80}{95} \times 360^\circ \simeq 303^\circ$

Sim (15)

Não (80)




Zona Rural

Calcular os ângulos:

Sim: $\frac{70}{105} \times 360^\circ = 240^\circ$


Não: $\frac{35}{105} \times 360^\circ = 120^\circ$




Não (35)

Sim (70)

3.5.6




3.5.7



Distribuição dos pacientes por faixa etária

3.5.8. Rim



3.5.9. $n = 30$

$x_{max} = 96$

$x_{min} = 64$


$A = 96 - 64 = 32$

$K = 1 + 3{,}322 \log(30)$

$K = 5{,}9 \approx 6$

$h = \frac{32}{6} = 5{,}33 \approx 6$

classes	Fi
64-70	1
70-76	5
76-82	8
82-88	10
88-94	5
94-100	1
Total	30



Distribuição das frequências por intervalo de pressão arterial (mmHg)