Marca de classe (xi)

A ponto mais alto do gráfico fica na marca de classe 21,5 cuja frequência é 10

18 x 3,54

3.5.1 Dado o exercícios 2.8.4 foram examinados 20 pacientes e classificados em lesões biológicos da lema da roca : [illegible], em cada nodo grau

Tabela de frequência

conrei queantias vozes apare o cada
coregorias

jello - 8 P
modorado - 9 P
seueno - 3 P

verifiquei 8+9+3=20.

Esrágios	Frequencia(fi)	Fri	percentagem
Sollo	9	0,40	40%
rodorado	3	0,215	45%
Severo	8	0,15	15%
Total	20	1,00	100%

2) Calcula os ângulos do gráfico

Um cinculo complero rem 360° para
ângulo do cada secroo usei

Ângulo: $\frac{fi}{n} \times 360°$

Leve: $\frac{8}{20} \times 360° = 144°$

moderado $\frac{9}{20} \times 360° = 162°$

severo $\frac{3}{20} \times 360° = 54°$

Verifique: $144° + 162° + 54° = 360$

O gráfico de sectores

Distribuição dos pacientes por estágio da doença



R: O estágio moderado foi o mais frequente, representando 45% dos pacientes.

3.5.2 Desenhar um gráfico de barras com os dados dos exercícios 2.8 e 6, os dados correspondem aos tipos sanguíneos de 20 doadores.

Portanto liga a seguinte tabela

Tipo sanguíneo	Fi	Fri
A	16	40%
B	6	15%
A B	3	7,5%
O	15	37,5%
Total	40	100%

Desenhei o gráfico de barras tipos sanguíneos dos 40 doadores



R: A tipo sanguíneo A é o mais frequente, com 16 dadores (40%) seguido do tipo O com 15 doadores (37,5%).

3.5.3

Desenhar um gráfico de sectores com os dados do exercícios 2.8.8

as hábitos ob sucções do crianças ente 3 e 6 anos;

Não tinham hábitos de sucção: 615
Sucção do polegar: 190
usavam chupetas 588
usavam mamadeiras 618
calculando
N= 615+190+588+618 = N=2011

Agora Irei calcular as frequencias relativas e os ângulos:

$fri(\%) = \frac{Fi}{2011} \times 100$ Angulo $= \frac{Fi}{2011} \times 360°$

2011 → N

Hábitos	Fi	Percentagem	Angulo do sectorado
Sem hábitos de sucção	615	30,58%	
Sucção do polegar	190	9,45%	
chupeta	588	29,24%	
Mamadeira	618	30,73%	
Total	2011	100%	

3.5.4
dados
classe i
vagam
valon
dias
A am
utiliz
cobaia
Tabela



gráfico de setores
distribuição das fotoras de
secção

R: A tomada é a categoria
com maior frequência, com
618 crianças, equivalentes a
aproximadamente, 30,13%.

3.5.4 Construir um histograma com os dados 2.8.11 utilizando intervalos de lasse iguais.

rganizei os dados em classe com alor mínimo é 1 dia e o máximo 17 dias

A amplitude total é A=17-1=16

tilizei cinco classes de largura 4 dias, obrindo os valores de 1 a 20.

abela de distribuição de frequências

Intervalo de internamento	Frequência
1 à 4 dias	11
5 - 8 dias	13
9 - 12 dias	7
13 - 16 dias	4
17 - 20 dias	1
Total	36

Tempo de internamento [illegible]



R: A classe de 5 à 8 dias é a mais frequente com 13 pacientes.

3-5-5

Zona de residência	Ab
urbana	Ab
rural	

Zona urba

Nq = 15 + 80

percentag

$\frac{15}{95} \times 10$

percentag

$\frac{80}{95} =$

Angulos

Zona urba

Abandono

3-5-5

Zona de moradia	Abandonaram (sim)	Não abandonaram	Total	
Urbana	15		80	95
Rural	10		35	105

Na zona urbana total do paciente

$N_u = 15 + 80 = 95$

Percentagem que abandonaram

$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

Percentagem que não abandonaram

$\frac{80}{95} = 100 = 84,21\%$

Ângulos do gráfico: Sim $\frac{15,79 \times 360^\circ}{100}$

$\approx 56,84^\circ$

Não: $\frac{84,21\% \times 360^\circ}{100} = 303,16^\circ$

Zona urbana

Abandono do tratamento = zona urbana



zona rural
Total do pasiente
N = 70 + 35 = 105

· porcentagem que dormem
$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

porcentagem que não dormem mais
$\frac{35}{105} \times 100 = 33,33\%$

Ângulos do gráfico
Sim $= \frac{66,67\% \times 360°}{100} \approx 240°$

Não $\frac{33,33\% \times 360°}{100} \approx 120°$



B: Com
[illegible]
[illegible]
Na zona p
[illegible]
proporção
na zona z

3.5.6

Desenha
com os d

Calcula

N = 27
+ 11530

$N_6 = 343$

B: Com esse pe cese que na zona
urbana, 15,19% dos pacientes doando
[illegible]
Na zona rural a percentagem é de 66,61
portanto os dados mostram uma
proporção de doadores muito superior
na zona rural

3.5.6

desenha gráfico de barras horizontais
com os dados do exercício 2.8.15

Calcular totais por sexo

$N = 214331 + 16065 + 150388 + 55185 =$
$+ 11530 + 101031 + 88563 =$

$N_m = 522195$ somatório
dos òseros masculino

$N_f = 373159$
somatório dos òseros femininos