Agora calculamos frequências relativas

Fórmula:

$$Fr(\%) = \frac{\text{categoria}}{\text{total do sexo}} \times 100$$

Vou dar um exemplo para doenças infecciosas parasitárias masculino.

$$Fr = \frac{27431}{522795} \times 100 \quad Fr = 5,25\%$$

Apliquei a mesma fórmula a todos os grupos abaixo:

Grupos de causas	Masculino	Feminino
Doença infecciosa para	5,25	4,98
Neoplasias	14,55	11,32
Doença do aparelho circulato	28,11	36,15
Afecções do período perinatal	3,35	12,41
Causas externas	20,17	3,52
Demais causas definida	16,91	5,45
Doença do apa. respi	10,61	20,11
Total	100%	100%

Gráficos de barras
Frequência relativa dos óbitos



Causas externas



Demais casos

R: Portanto se percebe que, em ambos sexos a doença do aparelho circulatório apresentou a maior percentagem, uma proporção bastante superior nos homens (20,47%) do que nas M (5,25%)

3.5.1 Desenho um histograma com os dados do exercício 2.8.16

A tabela 2.22 apresenta um número de pacientes.

Calculando total
Nº: 10/66 + 115/66 + 2,145
Nº = 290

Faixa etária	Frequência	Frequência relativa
30-40	10	3,215
40-50	66	22,76
50-60	119	41,63
60-70	66	22,76
70-80	24	8,28
80 e mais	5	1,72
Total	290	100%

$Fi = \frac{10}{29} \times 100 = 3,2148 \approx 3,215$

$F = \frac{66}{290} \times 100 = 22,76$

Cálculo para faixa etária dos 50-60 anos

$Fa = \frac{119}{290} \times 100 \Rightarrow Fai = 41,03\%$



B: A faixa etária de 50 à 60 anos é mais frequente com 119 pacientes

corespondendo ao espaço de 41,03% de
total

3.5.8 Com base nos dados da tabela
3.4 . Construi uma tabela de dis-
tribuição de frequências

Vou calculando ponto médio

Formula

$$x_i = \frac{\text{lim inf} + \text{lim sup}}{2}$$

$$64-69: \; x_i = \frac{64+69}{2}$$

$$x_i = 66,5$$

$$K = 1+3,322 \log(30)$$

$K = 5,91 \approx 6 \rightarrow$ 6 classes

Vou calcular a longura das classes

$h = \frac{A}{K} = \frac{32}{6} = 5,33$, depois arredondo
de 5,33 para 6

classe
64 - 6
70 - 7
76 -
82 -
88 -
94 -
total

Fa (

gaô

Rim
Coac
xigóc
pula

classes	Ponto médio	Fi	Fn	Fn i(%)
64-69	66,5	1	1	3,33
70-75	72,5	5	6	16,67
76-81	78,5	8	14	26,67
82-87	84,5	10	24	33,33
88-93	90,5	5	29	16,67
94-99	96,5	1	30	3,33
total	—	30	—	100%

$Fn(\%) = \frac{fi}{30} \times 100$ 2-7

$Fn = \frac{1}{30} \times 100 = 3,33$

$Fn = \frac{6}{30} \times 100 = 16,67$

gráficos de barras horizontais



Eu pude [illegible] entender que [illegible] a presença da uma [illegible] do [illegible] usado de 200% porque a tabela regista 210 mas [illegible] por 105 [illegible], em média.

3.5.9 - Distribuição de frequências e histograma

Temos 30 valores da pressão sanguínea diastólica

1º passo: Identificar valores extremos
- Menor valor: 64
- Maior valor: 96

Amplitude:

A = 96 - 64 = 32

Vamos organizar em 6 classes, com amplitude 6.

2º passo: Tabela de distribuição de frequências

classes
64 - 69
70 - 75
76 - 84
82 - 87
88 - 93
94 - 99
Total

Histogra



classes	Frequência(fi)
64 - 69	1
70 - 75	5
76 - 81	8
82 - 87	10
88 - 93	5
94 - 99	1
Total	30

Histograma de frequências



3.5.10 - Organizoa os dados

64, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79
80, 80, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 85
85, 86, 87, 87, 88, 99, 90, 91, 92, 96

n = 30 numeros

Minimo: 64
Maximo: 96

Amplitude total 96-64 = 32

Tabela de distribuição de frequencias

classes	Marca de classe xi	Frequencia fi	Frequencia acumu
60-69	66,5	1	1
70-75	72,5	5	6
76-81	78,5	8	14
82-87	84,5	10	24
88-93	90,5	5	29
94-99	96,5	1	30
Total	___	30	

$xi = li$

$xi = 64$

$\frac{70+7}{2}$

$\frac{88+93}{2} =$

Poligono



Apocno mo
moaca do

$$xi = \frac{\text{lim infe} + \text{lim sen}}{2}$$

$$xi = \frac{64+69}{2} = 66,5$$

$$\frac{70+75}{2} = 72,5 \qquad \frac{82+87}{2} = 84,5$$

$$\frac{88+93}{2} = 90,5 \qquad \frac{94+99}{2} = 96,5$$

$$1+5+8+10+5+1 = 30$$

Poligono de Frequencia



A ponto mais alta do gráfico fica na marca da classe 84,5 cuja frequência é 10