Exercícios 3.5


5.1) Desenhe um gráfico de setores para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.4

Estágio	Frequência	Percentagem
Leve	8	40%
Moderado	9	45%
Severo	3	15%
Total	20	100%

$FR = \frac{f}{N} \times 100$ <-> $FR = \frac{8}{20} \times 100 = 40$


$FR = \frac{9}{20} \times 100 = 45$

$FR = \frac{3}{20} \times 100 = 15$




O estágio moderado apresenta maior frequência, com 45% dos pacientes.

3.5.4) Dar um histograma para apresentar a distribuição de frequências que você construiu usando intervalos de classes iguais, conforme pedido no exercício 2.8.1




R: A classe de 5 - 8 dias apresenta a maior frequência com 13 pacientes.

3.5.2) Desenhe um gráfico de barras para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no exercício 2.8.



R: O tipo sanguíneo A é o mais frequente, com 16 doadores. O tipo AB é o menos frequente, com 3 doadores.

3.5.3) Desenhe um gráfico de setores para apresentar a distribuição de frequências que você construiu, conforme pedido no exercício 2.8.b



R: O hábito mais frequente é o uso de mamadeira, com 30,73%. A sucção do polegar é a menor frequência, com 9,45%.


3.5.5) Desenhe dois gráficos de setores (um para cada zona de moradia) para apresentar a distribuição de frequência que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.13

① Zona urbana

{ Abandonados = 15 pac
{ N. abandonado = 80 pac
Total ⇒ N = 15 + 80 = 9

$FR = \frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

$FR = \frac{80}{95} \times 100 = 84,21\%$




② Zona Rural

{ Abandonado = 70 pc
{ N. Abandonados = 35 pc

Total ⇒ N = 70 + 35 = 105


$FR = \frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

$FR = \frac{35}{105} \times 100 = 33,33\%$




R: A taxa de abandono foi mais baixo na zona rural.

3.5.6) R: Gráfico de Barras horizontal




Dumais causa



0% 10% 20% 30% 40%

3.5.7) Desenhe um histograma para apresentar a distribuição de frequência que você construiu conforme pedido no Exercício 2-B-16



R: A faixa etária de 50-60 anos apresentou a maior frequência de fumantes, com 119 fumantes correspondendo a 41,03%. Logo é a faixa etária de maior risco entre os apresentados nos dados.

Altair

3.5.8) Desenhe um gráfico de barras (as barras na posição horizontal) para apresentar a taxa de aproveitamento para cada órgão, usando os dados apresentados na tabela 2.23 do Capítulo 2

Fórmula: $\frac{\text{Órgão aproveitado}}{\text{Órgão disponível}} \times 100$

Rim: $TA = \frac{210}{210} \times 100 = 100\%$


Coração: $TA = \frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

Fígado: $TA = \frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

Pulmão: $TA = \frac{17}{210} \times 100 = 8,10\%$

Órgão	Taxa de aproveitamento
Rim	100%
coração	42,86%
Fígado	19,05%
Pulmão	8,10%

O rim apresentou a maior taxa de aproveitamento, com 100%, e o pulmão apresentou a menor taxa de aproveitamento, com 8,10%.



3.5.9) Com base nos dados apresentados na tabela 3.4, faça uma tabela de distribuição de frequência. Desenhe um histograma.

81; 89; 91; 81; 79; 82; 70; 80; 92; 61; 73; 86; 87; 74; 72; 75; 90; 76; 83; 79; 82; 82; 78; 85; 77; 83; 85; 87; 88; 80

Menor valor = 64


Maior valor = 96

$A = 96 - 61$

$A = 32$

$h = \frac{32}{6} = 5,33$

Intervalo	Frequência (f)
64 - 69	1
70 - 75	3
76 - 81	8
82 - 87	10
88 - 93	5
94 - 99	1
Total	30



3.5. 10) Com base nos dados apresentados na tabela 3.4 faça uma tabela de distribuição de frequência. Desenhe um polígono de frequência.

Fórmula

$$x_i = \frac{l_i + l_s}{2}$$

$$x_i = \frac{82 + 87}{2}$$

$$= \frac{169}{2} = 84,5$$

$$x_i = \frac{64 + 69}{2} = \frac{133}{2} = 66,5$$

$$x_i = \frac{70 + 75}{2} = \frac{145}{2} = 72,5$$

$$x_i = \frac{76 + 81}{2} = \frac{157}{2} = 78,5$$

$$x_i = \frac{88 + 93}{2} = \frac{181}{2} = 90,5$$

$$x_i = \frac{94 + 99}{2} = \frac{193}{2} = 96,5$$

classes	Ponto médio (x_i)	f_i
$64 - 69$	66,5	1
$70 - 75$	72,5	5
$76 - 81$	78,5	3
$82 - 87$	84,5	10
$88 - 93$	90,5	5
$94 - 99$	96,5	1
total		30

