
4.6.13. Exemplo: considere o seguinte conjunto de dados: [2, 3, 3, 3, 4]
(valor central)

Moda: 3 (é o valor que mais repete).
Mediana: 3 (é o valor central quando ordena dos).
Média: $\frac{2+3+3+3+4}{5} \Rightarrow \frac{15}{5} = 3$


4.6.14.
R: A média não pode ser calculada com exatidão.
Porque, a última classe da tabela é uma classe aberta ("4 ou mais), como não conhecemos o limite superior dessa categoria nem o valor exato de cada reclamação inserida nela, é impossível determinar o ponto médio da classe ou realizar o somatório exato necessário para o cálculo da média aritmética.

3.5.1. Distribuição por gravidade




3.5.3

Distribuição de frequência simples (categoria / hábito)




3.5.2.




Tempo de internação de pacientes

3.5.4.




3.5.5.


Distribuição de abandono de tratamen




3.5.6. Frequência relativa de óbitos por grupo de causas



3.5.7 Histograma: Pacientes portadores de carcinoma



3.5.8. Taxa de aproveitamento por orgão (%)



3.5.9 Valores em ordem:


64, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 85, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92

valor mínimo: 64
valor máximo: 96


Amplitude total: 96 - 64 = 32

Intervalo de classe	Ponto médio (x_i)	f_i	f_{ri}
[64, 70[	67	1	3,33%
[70, 76[	73	5	16,67%
[76, 82[	79	8	26,67%
[82, 88[	85	10	33,33%
[88, 94[	91	5	16,67%
[94, 100[	97	1	3,33%
Total		30	100%

Histograma de frequência (Pressão diastólica)



3.5.10. Polígono de frequências (Pressão diastólica)



De