2.8.9

Os pesos dos Bombeiros variam entre 70 Kg e 118 Kg.

Amplitude total $A = 118 - 70 = 48$ Kg

Largura das classes

$h = \frac{A}{n}$ $\quad h = \frac{48}{10} = 4,8$ Kg

$h = \frac{48}{10} = 4,8$ Kg

2.8.10

Número de enfermeiros em serviço

Classes : 20 - 25 ; 25 - 30 ; 30 - 35 ; 35 - 40, 40 - 45 ; 45 - 50

$h = 4_5 - 1_i$

$h = 25 - 20 = 5$

$A = V_{max} - V_{min}$

$A = 50 - 20 = 30$

Número de classe 6

Intervalo de cada classe 5

Amplitude total 30 enfermeiros

2.8.11)

A tabela contém 36 pacientes. Os tempos de internamentos em dias não agrupados em classes.

Intervalo de internamento	
1 - 4 dias	11
5 - 8 dias	18
13 - 16 dias	7
17 - 20 dias	4
Total	36

$N = 11 + 18 + 7 + 4 = 36$

4.6.3. A mediana também corresponde a um valor observado quando o quantidade de dados é impar, mas, quando é par, pode ser a média dos dois valores centrais e não pertence ao conjunto também ao mesmo tempo pode não ser um valor observado

4.6.4. Quatro pessoas tem uma média de 20 anos. Se uma pessoa com 40 anos entra na sala, qual passa a ser a idade média do grupo?

Média - 20 anos
Pessoas - 4 + 1 anos

$\Rightarrow 4 \times 20 = 80$ anos

$S = 80 + 40$
$= 120$

$\bar{x} = \frac{150}{50} = 24$ anos

4.6.5. Calcular média e mediana da taxa de glicose

média

$\bar{x} = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6} = 600$

$= \frac{600}{6} = 100$

mediana

95; 97; 98; 101, 104, 105

$\text{Mediana} = \frac{98 + 101}{2} = 99,5$

R: Contudo 22 tinham sua formação negativamente.

2.15 o Numero de óbitos por grupos de causas

Frequencia Relativa dos óbitos

m → masculino f → feminino

obm = 522795 dos obitos masculino

obf = 378759 → obitos femininos

Frequencia relativa $F_r = \frac{27437}{522795} \times 100$ $F_r = 5,25\%$

- Tabela de F Relativo

Causas	Masculino (%)	Feminino (%)
D.I-Parasito	5,25	4,98
-Neoplasias	14,55	17,32
D. aparelho cir	28,17	36,15
D. aparelho Res	10,67	12,41
Infecção	3,35	3,52
Causa externa	20,47	5,45
105 doadores Numero	16,94	20,17
Taxa = $\frac{\text{ongão aproveitado}}{\text{doadores}}$	total = 100%	100%

Rim = $\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

Coração = $\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

Figado : $\frac{20}{105} \times 100 = 16.1$

Orgão	Numero de doadores	ongão aproveitado	Taxa de perca
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Figado	105	20	19,05
[illegible]	105	17	16,19%

4.61| Calcular mediana, média e moda

8; 3; 0; 6; 8

a)

Média $\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} = 5$

Mediana

ordenado: 0, 3, 6, 8, 8

6 nolen que está no centro é 6 então o 6 é a mediana

Moda

A moda é o 8 porque está o repetiu

R: A média é 5, mediana é 6 e moda 8

b) 8; 16; 2; 8, 6

Média

$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$

Mediana

Ordenado 2, 6, 8, 8, 16

A mediana é 8

Moda

Moda é 8

R: a média = 8; mediana = 8; moda = 8

Valor ordenado

60; 65; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

a) Mediana = 70kg

$f_r = \frac{16}{40} = 0,4$ $f_r = \frac{6}{40} = 0,15$ $f_r = \frac{3}{40} = 0,075$ $f_r = \frac{15}{40} = 0,375$

O tipo sanguíneo A apresentou a maior frequência 16 dolares, com 40%.

2.8.7. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, supondo que não tenha sido conferido nenhum outro grau

Dados: A = 100% - 70% - 5% A = 25%

Total: N = 80

Grau B: 70%

Grau C 5%

Restantes alunos: grau A $f_A = \frac{25}{100} \times 80$ $f_A = 0,25 \times 80$

$f_A = 20$

R: Alunos que receberam grau A são 20.

2.8.8 R:

Sem hábitos de sucção: 615

Sucção do polegar: 190

Uso de chupeta: 588

Uso de mamadeira: 618

$N = 615 + 190 + 588 + 618$

$N = 2011$

Hábito	Frequência	Frequência relativa
Sem hábitos de sucção	615	30,58%
Sucção do polegar	190	9,45%
Uso de chupeta	588	29,24%
Uso de mamadeira	618	30,73%
Total	2011	100%

c) Pressão arterial

$S = 1820$

$\bar{x} = \frac{1820}{11} \approx 165,45$ mmHg

Valores ordenados

140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 200

Média = 160 mmHg

Resumidamente

Variável	Média	Mediana
Estatura	1,70 m	1,68 m
Peso	72,55 kg	70 kg
Pressão arterial	165,45 mmHg	160 mmHg

3.5.1

Foram examinados 20 pacientes e classificados em três estágios de uma doença: Leve, moderado, severo

Tabela de frequência

Leve: 8 pacientes

Moderado: 9 pacientes

Severo: 3 pacientes

8 + 9 + 3 = 20

Estágio	Fi	Fri	Percentagem
Leve	8	0,40	40%
Moderado	9	0,45	45%
Severo	3	0,15	15%
Total	20	100	100%

Moderado é mais frequente

3.5.5 ||

Zona de doença	Atendido sim	Atendido não	Total
Urbana	15	80	95
Rural	70	35	105

Zona Urbana

Total de pacientes

~~20 = 15 + 80 = 95~~

$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

Percentagem não atendidos

$\frac{80}{95} = 100 = 84,21\%$

Ângulo do gráfico: Sim $\frac{15,79\% \times 360}{100} = 56,84$

Não: $\frac{84,21\% \times 360}{100} = 303,16$