Formula

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n}$$

considerando as [illegible] que demoraram

$$\bar{x} = \frac{(0,5 \times 2) + (1 \times 4) + (1,5 \times 3)}{9}$$

$$= \frac{1 + 4 + 4,5}{9}$$

$$= \frac{9,5}{9} \quad \bar{x} = 1,06 \text{ minutos}$$

O tempo médio de [illegible] das [illegible] que atendimento [illegible] foi de aproximadamente [illegible] 1,06 minutos. O [illegible] que não domina não possui [illegible] observado.

4.6-9 Determine a moda a media na e a mediana de cada sexo tabela 4.11

Masculino: 6,9,6,8,7,6
Feminino: 4,10,6,8,6,8

média

1- masculino: $\frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

Feminino $\frac{42}{6} : 7$

$\frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$\frac{42}{6} : 7$

mediana: masculino

organizar

6, 6, 6, 7, 8, 9 $\frac{6+7}{2}$ = md: 6,5

Feminino

organizar

4, 6, 6, 8, 8, 10 md: $\frac{6+8}{2}$ = md: 7

Moda masculino

a moda : 6

Para

Feminino a moda :

6 e 8

1.6. Determine a média a mediana de cada sexo tabela 1.18

Dados Masculino: 0,5, 1,4, 0,9, 0,8, 1,3
, 0,5

Feminino: 0,9, 0,6, 0,5, 1,3, 0,8, 0,7

A Masculino
1. Média

$$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$$

$$= \frac{5,4}{6} \quad \bar{x} = 0,9 \text{ litros}$$

2. Mediana
Ordenar
0,5, 0,5, 0,8, 0,9, 1,3, 1,4

$$Md = \frac{0,8+0,9}{2}$$

$$Md = 0,35 \text{ litros}$$

Moda: é 0,5. Mo $\boxed{0,5L}$

la

0,8, 1,3

1

3 Termino

Média = $\frac{0,9 + 0,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7}{6}$

$= \frac{4,8}{6} = 0,8$

2. mediana ordenar

0,5, 0,6; 0,7, 0,8, 0,9, 1,3

Md = $\frac{0,7 + 0,8}{2}$ Md = 0,75

moda: não tem

4.6.14 para a mínima mediana e a moda

tabela 4.19

dados 20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35

mediana

organizar:

15, 15, 20, 20; 25, 30, 30, 35, 40, 50

como temos 10 valores calculamos a média dos dois valores centrais

Md = $\frac{25 + 30}{2}$

Md = 27,5 dias

2. Moda

. 15 aparece 2 vezes
. 20 aparece duas vezes
. 30 aparece duas vezes

$Mo = 15; 20; 30$

A mediana é 27,5 dias e a moda é 15, 20 e 30 dias

4.6.1 Determinar a média dos dados da tab 4.20

2,5, 4,9, 4,7, 0,8, 2,4, 5,7, 3,3
1,4, [illegible], [illegible], [illegible] 1,6; 3,5

Formula

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{2,5 + 4,9 + 4,7 + 0,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 1,4 + 1,6 + 3,5}{10}$$

$\bar{x}$ 3,62 $\boxed{\bar{x} = 3,62}$

4.6.13 A média a mediana e a moda podem ser iguais?

R: sim.

Exemplo 2, 2, 2, 2, 2

$$\bar{x} = \frac{2+2+2+2+2}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Média = 2

Mediana = 2 está no centro

Moda 2 - aparece mais vezes

4.6.14 Qual das medidas de tendência central não pode ser calculada para a tabela 4.21? Por quê?

R: A média aritmética não pode ser calculada exatamente porque a tabela apresenta a seguintes categorias de reclamações:

0 reclamações
1 reclamação
2 reclamações
3 reclamações

Houve mais reclamações
A última interrogação é absurda
porque não sabemos o nº, nem
o exato de reclamações de cada pessoa
que participou da pesquisa

Assim não conseguimos calcular
a média aritmética exata