2.8.1

a) Variável quantitativa contínua

b) Variável qualitativa nominal

c) Variável quantitativa contínua

d) Variável quantitativa contínua

e) Variável qualitativa nominal

f) Variável quantitativa Discreta

g) Variável quantitativa Discreta

h) Variável quantitativa contínua.

2.8.2

Total de pessoas: 852
Sem opinião/não conhecem: 59
Favoráveis: 425
Contrários: 852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Frequência Absoluta (f_i)	Fr. relativa
Favoráveis	425	0,4988
Contrários	368	0,4319
sem opinião/não conhecem	59	0,0692
Total	852	1,0000

Digitalizada com CamScanner

2.8.3

[illegible]	Frequência	Frequência relativa
[illegible]	16	0,08
[illegible]	36	0,18
[illegible]	90	0,45
[illegible]	30	0,15
[illegible]	80	0,14
Total	200	1,0

2.8.4

Categoria	Frequência	Frequência Relativa
Severo	8	0,40
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1,00

2.8.5

Classe
20 – 30
30 – 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: O erro identificado é falta de uma classe de intervalo está tabela está incompleta. Ela passa diretamente de classe de 40 a 50 para a classe de 60 a 70, esqueceu-se completamente de incluir o intervalo de 50 a 60. A Tabela está incorreta.

2.8.6

Tipos de sangue de 40 doadores

Contagem dos tipos sanguíneos:

Tipo A: 12
Tipo B: 6
Tipo AB: 3
Tipo O: 19

Digitalizada com CamScanner

Tipo do sangue	Frequência Absoluta (fi)	Fr. relativo (fri)	Fr. Relativo (%)
A	12	0,30	30%
B	6	0,15	15%
AB	3	0.075	7,5%
O	19	0,475	47.5%
Total	40	1,00	100%

2.8.7 Percentagem do grau A: 100%.

Percentagem A = 100% - 70% - 5% = 25%

2.8.8

Hábito de sucção	Fr. Absoluto (fi)	Fr. Relativo (fri)	Fr. Relativo (%)
Sem hábitos	615	0,3058	30,58%
Sucção do polegar	190	0,0945	9,45%.
Chupeta	588	0,2924	29,24%
Mamadeira	618	0,3073	30,73%.
Total	2011	1,0000	100,00%.

2.8.9 $x_{max} - x_{min}$

AT = 118 - 70 = 48 kg

$h = \frac{48}{10} = 4,8$ k

Classes

1. 70 ⊢ 74,8
2. 74,8 ⊢ 79,6
3. 79,6 ⊢ 84,4
4. 84,4 ⊢ 89,2
5. 89,2 ⊢ 94,0
6. 94,0 ⊢ 98,8
7. 98,8 ⊢ 103,6
8. 103,6 ⊢ 108,4
9. 108,4 ⊢ 113,2
10. 113,2 ⊢ 118,0

Digitalizada com CamScanner

2.8.10

$n = 25 - 20 = 5$

Intervalo de Toda distribuição é

$A: X_{max} - X_{min}$

$AT: 80 - 20 = 30$

2.8.11

x mínimo - 1 x Máximo $= 17 \Rightarrow AT = 16$

$h = \frac{16}{4} = 4$

2.8.16

Faixa etária Comos	Fr. Absoluto Fi.	Fr. relativo	Fr. Relativo (%)
30 ⊢ 40	10	0,0345	3,45%.
40 ⊢ 50	66	0,2276	22,76%.
50 ⊢ 60	119	0,4103	41,03%.
60 ⊢ 70	66	0,2276	22,76%.
70 ⊢ 80	24	0,0828	8,28%.
80	5	0,0172	1,72%.
Total	290	1,0000	100,00%.

2.8.17

Orgão	Numero de doores	Total de orgão disponivel	N.O. Aprovi	Taxa de Aj%
Rim	105	210	210	100,00%.
Coração	105	105	45	42,86%.
Figado	105	105	20	19,05%.
Pulmão	105	210	17	8,10%.

Digitalizada com CamScanner

2.8.13

Zona Urbana:

- Sim (casamento): 15
- Não (casamento): 80

Total = 15 + 80 = 95

Zona Rural

- Sim (casamento) 70
- Não (casamento): 35

Total: 70 + 35 = 105

Taxa de casamento

Zona Urbana

$T.A = \frac{15}{95} \times 100 \approx 15,79\%$

Zona Rural

$T.A = \frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

2.8.14

Sim = 78

Não = 100 : 100 - 78 = 22

Emprego com método de pesquisa	Frequência Absoluto (fi)	Frequência relativo (fr)	Frequência Relativo
Sim	78	0,78	78%
Não	22	0,22	22%
Total	100	1,00	100%

Digitalizada com CamScanner

18.618 + 27.497 + 76.065 + 46.969 + 19.165 + 20.368 + 8.223 = 219.759

Total

522.795 + 219.759 = 896.554

Grupo de causas	Nascidos (f)	Mortalidade %	Faleceram (f)	Faleceu %
Doenças infecciosas e parasitárias	27.497	5,25%	18.618	4,98%
Natalidade	76.065	14,55%	64.724	17,32%
D. do aparelho circulatório	150.389	28,77%	135.119	36,15%
D. do A. Respiratório	55.785	10,67%	46.969	12,44%
Afecções originadas no período neonatal	17.590	3,35%	19.165	5,52%
causas externas	107.092	20,47%	20.368	5,45%
Demais causas definidas	88.563	16,94%	75.999	20,17%
Total	522.795	100,00%	379.759	100,00%

Digitalizada com CamScanner