2.8.17 - taxa de aproveitamento de orgão

Orgão	número de doadores	orgão aproveitado	taxa aproveito
Rim	105	210	$\frac{210}{105} = 200\%$
Coração	105	45	$\frac{45}{105} = 42,9\%$
Fígado	105	20	$\frac{20}{105} = 19\%$
Pulmão	105	17	$\frac{17}{105} = 16,2\%$

A taxa de rim ultrapassa 100% porque cada doador pode fornecer dois rins. As demais taxas ficam abaixo de 50%, sendo o coração o orgão com melhor aproveitamento entre os que não são duplo.

Scanned by Gen Scanner

2.8.15 Frequência relativa da tabela 2.21 totais:

Masculino: 522,795
Feminino: 373,795
Total : 896,554

2.8.16 Frequencia relativa da tabela 2.22 total de pacientes: 270

Faixa etaria	Numero	Fr	Percentagem
30 - 40	10	0,0345	3,45%
40 - 50	66	0,2276	22,76%
50 - 60	111	0,4103	47,03%
60 - 70	66	0,2276	22,76%
70 - 80	24	0,0828	8,28%
8 ↑ mais	5	0,0172	1,72%
Total	290	1,000	100%

A faixa etaria de maior risco: 50 - 60 anos (47,03% dos casos)

2.8.6 Tipo Sanguíneo (40 doadores).

Contagem
A → 15
B → 6
AB → 3
O → 16

Tipo Sanguíneo	fi	Fn
A	15	0,375
B	6	0,150
AB	3	0,075
O	16	0,400
total	40	1,000

2.8.7 Frequência de alunos com grau A:

Total de alunos: 80
Grau B: 70% x 80 = 56
Grau C: 5% x 80 = 4
Como não há nenhum outro grau
Grau A = 80 - 56 - 4
R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8 Hábitos de sucessão

Hábito de sucessão	fi	Fn
Não tinha hábito de sucessão	615	0,306
sucessão do polegar	990	0,094
usava chupeta	588	0,292
usavam alguma alliança	618	0,308
total	2011	1,000

Scanned by Gen Scanner

2.8.15) Frequência relativa da tabela 2.21) totais:

Masculino: 522,795
Feminino: 373,795
total : 896,554

2.8.16) Frequencia relativa da tabela 2.22 total do paciente: 270

Faixa etaria	Numero	Fn	Porcentagem
30 - 40	10	0,0345	3,45%
40 - 50	66	0,2276	22,76%
50 - 60	111	0,4103	47,03%
60 - 70	66	0,2276	22,76%
70 - 80	24	0,0828	8,28%
8 e mais	5	0,0172	1,72%
total	290	1,000	100%

A faixa etaria de maior risco: 50 - 60 anos (47,03% dos casos)

Conjunto B (n = 100)

K = 1 + 3,3 x 2 = 7,6 → 8 classe
Amplitude total = 821 − 187 = 634
Amplitude de classe = 634/8 = 79,25
→ 80

2.8.13 Taxa de abandonamento do tratamento:

Zona de moradia	Abandonaram (sim)	Não abandonaram	total	Taxa abandono
Urbana	15	80	95	15/95 = 15,8
Rural	70	35	105	70/105 = 66,7

2.8.14 Em fase com prevenção de cáries e doenças gengivais.

Respostas	f_i	$\frac{f_i}{n}$
Sim	78	0,78
Não	22	0,22
total	100	1,00

Scanned by Gen Scanner

Com intervalos pondidos

Tempo de internação	fi	Fn
1 dia	2	0,056
2 ou 3 dias	6	0,167
4 a 7 dias	12	0,333
8 a 14 dias	14	0,389
mais de 14 dias	2	0,056
Total	36	1,000

2.8.12 intervalo de classes sugeridas

Regra de sturges:

$K = 1 + 3,3 \log_{10} n$

consumtan A (n=50)

$K = 1 + 3,3 \times 1,70 = 6,6 +$ classe

Amplitude total = 70 - 24 = 46

Amplitude de classe = 46 : 7 = 6,6 - 7

classe sugeridas: 24 - 31, 31 - 38, 38 - 45, 45 - 52, 52 - 59, 59 - 66, 66 - 73

2.8 → Exercícios propostos

2.8.1 Tipos de variáveis

a) Peso de pessoa → quantitativa contínua

b) Marcas comerciais de um mesmo analgesio → quantitativa nominal

c) temperatura de pessoas → quantitativa contínua

d) Quantidade anual de chuva na cidade de São-Paulo → quantitativa contínua

e) Região → Quantitativa nominal

f) Número de dentes permanentes irrompidas em uma criança → quantitativa discreta.

g) Número de bebês nascido por dias em uma maternidade → quantitativa discreta

Scanned by Gen Scanner

Conjunto B (n = 100)

K = 1 + 3,3 x 2 = 7,6 → 8 classe
Amplitude total = 821 − 187 = 634
Amplitude de classe = 634/8 = 79,25
→ 80

2.8.13 Taxa de abandonamento do tratamento:

Zona de moradia	Abandonaram (sim)	Não abandonaram	total	taxa abandono
Urbana	15	80	95	15/95 = 15,8
Rural	70	35	105	70/105 = 667

2.8.14 Em fase com prevenção de cáries e doenças gengivais.

Respostas	O_i	F_n
Sim	78	0,78
Não	22	0,22
total	100	1,00

Scanned by Gen Scanner

h) Comprimento de cães → quantitativa contínua.

2.8.2 A tabela

Pessoas entrevistadas: 852
sem opinião: 59
favoráveis: 425
Contrárias: 852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Frequencia	Frequencia relativa
Favoravel	425	0,499
Contrário	368	0,432
Sem opinião	59	0,069
Total	852	1,000

2.8.3 Completar a tabela.

Frequência da classe "9 a 10"

0,08 x 200 = 16

Frequencia relativas das demais classe:

$\frac{36}{200} = 0,18$ $\frac{30}{200} = 0,15$

$\frac{90}{200} = 0,45$; $\frac{28}{200} = 0,14$

Scanned by Gen Scanner

A tabela:

Nota de aluno	Frequencia	Frequencia relativa
de 9 ⊢ 10	16	0,08
de 8 ⊢ 8,9	36	0,18
de 6,5 ⊢ 7,9	90	0,75
abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,00

2.8.4 Estagios da doença

Dados (20 pacientes)

Contagem:
Leve → 8
Moderado → 9
Severo → 3

categoria	fi	Fr
leve	8	8/20 = 0,4
moderado	9	9/20 = 0,45
severo	3	3/20 = 0,15
total	20	1,00

2.8.5 Erro na distribuição de frequências. As classe apresentada são de 20 ⊢ 30, 30 ⊢ 40 40 - 50, 60 ⊢ 70 e nota-se existe uma falha entre as classes 40 ⊢ 50 e 60 ⊢ 70, faltava a classe 50 ⊢ 70. Além disso, a ultima classe (70) é aberta à direita o que é aceitavel mas a ausencia da classe intermediaria é o erro.

2.8.10 intervalo de discussão classe

20-25, 25-30; 30-35, 35-40, 40-45, 45-50.

intervalo de classe i de 5,

intervalo de toda distribuição = 30

2.8.11 Tabelas de distribuição de frequências (I - 2.19)

a) intervalo de classes iguais

Tempo de internação	fi	Fo
1 ⊢ 4	8	222
4 ⊢ 7	7	0,194
7 ⊢ 10	10	0,278
10 ⊢ 13	6	0,167
13 ⊢ 16	4	0,099
16 ⊢ 19	1	0,028
total	36	1000

b) com intervalo