2.8.4 Distribuição do pacientes segundo estagio de doença

Dados
Moderados; 9 pacientes
Leve: 8 paciente
Severo; 3 paciente

Formula

$F_r = \frac{F}{Total}$

Moderado F_r: $\frac{9}{20} = 0,45$
Leve $F_r = \frac{8}{20} = 0,40$
Severo F_r: $\frac{3}{20} = 0,15$

E. doença	Frequencia	Frequencia relativa
Leve	8	0,40
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1,00

2.8.5 Qual é o erro na distribuição de frequencia dada em seguida.

Nesta o erro é a falta da classe 50-60, a distribuição deve ser continua sem deixar interva de fora.

2.8.6 Distribuição de frequencia dos tipo de sangue.

Tipo de sangue	Frequencia	Frequencia relativa

$F_r = \frac{F}{}$

(3.56)





(3.5.7)



a faixa etária de 50 a 60 anos apresenta maior frequência com 119 pacientes

2.8.7 Dados
tatal dos alunos
Grau B 70%
Grau C: 5%
Grau A: ? 20

$70\% + 5\% = 75\%$

$100\% - 75\% = 25\%$

$A = \frac{25 \times 80}{100}$

$A = \frac{2000}{20} = 20$

R: São 20 alunos com grau A.

2.8.8
Não tinham hábitos de sucção 615
Chuparam o polegar: 190
Usaram chupeta: 588
Usaram mamadeira: 618

$t = 615 + 190 + 588 + 6$

$t = 2011$

$fr = \frac{F}{t} \times 100$

$fr = \frac{190}{2011} \times 100$

hábito sucção	F	Percento
Chupacom polega	190	9,4
chupeta	588	2[illegible]
mamadeira	618	[illegible]
tem hábito	615	[illegible]
total	2011	100%

2.8.9 Limites de 10 classes
valor maximo 70 Kg
" minimo 118 Kg
numero de classe 10
aplitude total
$At = 118 - 70 = 48$
intervalo entre classe
$ic = \frac{48}{10} = 4,8 \approx 5$

Classe
70 ⊢ 75
75 ⊢ 80
80 ⊢ 85
85 ⊢ 90
90 ⊢ 95
95 ⊢ 100
100 ⊢ 105
105 ⊢ 110
110 ⊢ 115
115 ⊢ 120

Opiniões	Frequências	Percentagem
P. favorável	425	49,9%
Contrágio	368	43,2%
P. que não tem.	~~8~~59	6,9%
total	852	100%

(2.83) Distribuição de notas de 200 alunos

Nome de aluno	Frequencia	Frequencia relativo
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8.9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,0

$F = 0{,}08 \times 16$

$F_H = \frac{F}{200} =$

$= \frac{36}{200} = 0{,}18$

2.8.17 Numeros de orgãos obtidos de doadores cada um coração

Figado

$P = \frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

$P = \frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

rim

$P = \frac{N.\ orgaos}{n.\ dadores}$

$P = \frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

Pulmão

$P = \frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$

Orgão	N. doadores	N. orgão aproveitado	taxa de aproveitamento
Rim	105	210	100%.
coração	105	45	42,9%
Figado	105	20	19,0%
Pulmão	105	17	81,%

O Rim foi orgão com maior aproveitamento e os pulmões apresenta menos taxa.

3.5.1



distribuição dos pacientes segundo o estagio da doença

3.5.2



Distribuição dos doadores de sangue segundo o tipo de sangue

3.5.3



O habito de usar mormoduao apresenta a maior frequencia com 30,73%.

3.5.4 Dados dos 36 pacientes internados



3.5.5



Rural



Taxa de abandono do tratamento contra a tuberculose pulmonar segundo a zona de moradia

4.6.1 A Media = 5; mediana = 6; moda = 8
B Media = 8; mediana = 8; moda = 8
C Media = 11; mediana = 10; moda = 10
D Media = 1; mediana = 0; não tem moda
E Media = 2; mediana = 1; duas modas 1,2

4.6.2
A medida de tendencia central e mediana

4.6.3) E a moda

4.6.4) 2 horas

4.6.5 A media e 100 miligrama por 10 ml de sangue e a mediana e 99,5 miligrama por 100 ml de sang

4.6.6) estatura media = 1,70 m; mediana = 1,68 m
peso medio: 72,5 kg; mediana 70 kg
Pressão arterial media = 165,5 mmHg mediana 160 mmHg

4.6.7) Masculino media = 0,88 cariado; feminina: media 1 dente cariado

4.6.8 1,06 minuto. O rato não dormiu não entra media, porque tempo de latencia e o tempo para a droga fazer efeito no caso dormir

① Dados
n = 100
Mínimo: 187
Máximo. 821

At = 821 - 187 = 634
Nc = 1+3,3 log 100 ≈ 8
$Ic = \frac{634}{8} = 79,25 \approx 80$

185 ⊢ 250
250 ⊢ 315
315 ⊢ 380
380 ⊢ 445
445 ⊢ 510
510 ⊢ 575
575 ⊢ 640
640 ⊢ 705
705 ⊢ 770
770 ⊢ 835

2.8.13
Taxa de abandono no centro, tuberculose pulmonar segundo a zona de moradia

$P = \frac{N.\ abandonos}{totais}$ 15+80 = 95

$P = \frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

zona rural
70+35 = 105 $P = \frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

zona	sim	não	total	taxa de abandono
urbano	15	80	95	15,8%
rural	70	35	105	66,7%
total	85	115	200	42,5%

2.8.14 Distribuição de frequência dentista segundo adoção método de prevenção de cárie e doença gengival no consultório

Prevenção	Frequência	Percentagem
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

total de dentistas 100
Sim 78
Não 22

A prática de prevenção deveria ser adotada por 100% dos dentista

Diosimo Soares

(2.8.1) (A) - Peso das pessoas : qualitativa continua

(B) - Marcas comerciais do mesmo analgesico : Qualitativo nominal

(C) - Temperatura das pessoas : Qualitativa continua

(D) Quantidade de chuva na cidade da são paula? Qualitativa continua

(E) - Religião : qualitativa nominal

(F) - Numeros de dentes permanentes irrompidos em criança : discreta

(G) Numeros de bebés nascido por dia em uma - maternidade : discreta

(h) - Comprimento de cães : numerica continua

2.8.2

Dados

total das pessoas 852

Pessoas sem opnião ou não conheciam assunto 59

Favorais 425 852-(59+425)=368

Contraria ?

3.5.8.



O rim apresenta maior taxa de aproveitamento com 200% ~~pro~~ e os pulmões com menor taxa

~~3.58~~ 3.5.9 Histograma da pressão diastalica



Pressão sanguinea diastalica de 35 enfermeiros que trabalham em um hospital

3.5.10



Diasimó Soares

$Fr = \frac{27437}{522,795} \times 100\% = 5,24$

2.8.15

Fr.

$Fr \; \frac{\text{Frequencia}}{\text{Total}} \times 100$

Grupo e causa	Masculino		Feminino	
	Nº	%	Numero	%
Doenca infeciosa paras.	27.437	52%	18,615	5,0%
Neoplasia	76,069	14,5%	64,724	17,3%
Doença do aparelho circulatório	150,38	288%	135,119	36,2%
D. A Respiratorio	55,785	10,7%	46,369	12,4%
Afecções a	17,530	3,4%	13,165	3,5%
Causas externa	107,032	20,5%	20,368	5,4%
Demais c. definidas	88,363	16,9%	75,399	20,2%
Total	522795	100%	373,759	100,0%

Foram 896,554 obitos com causas definidas sendo 58,3% são homens e 41% são mulheres.

2.8.16 Pacientes portadores de carcinoma epidermoide invasivo com base da lingua segundo a faixa etaria

Faixa etaria	Numero	Frequencia relativa
30 ⊢ 40	10	3,4%
40 ⊢ 50	66	22,8%
50 ⊢ 60	119	41,0%
60 ⊢ 70	66	22,8%
70 ⊢ 80	24	8,3%
80 e mais	5	1,7%
total	290	100,0%

A faixa etaria de maior risco é 50 aos anos

4.6.9 Masculino : 7,00 por dia ; mediana : 6,5 grama por dia

Feminino media : 7,00 grama por dia
mediana : 7,0 grama por dia

4.6.10 Masculino media : 0,90 litro por dia ; mediana 0,85 litro por dia
Femenino media : 0,80 litro por dia ; mediana 0,75 por dia.

4,6.11. Metade das pacientes retornou as actividades mais de 27,5 dias depois de submetidas a histerectomia. não houve moda, ou seja nenhum numero de dias foi mais frequentes

4.6.12 3,62 miligramas de acidos ascórbico em 100 ml

4.6.13 Sim : 1, 2, 3, 4, 5 ([illegible]4) a media e a mediana e a moda são iguais a 3.

4,6.14 A media, porque a ultima classe não tem extremo superior definido

(2.8.10) - O intervalo de classe e 3 (conforme mencionado em serviço, o intervalo de todos a distribuição e 30.

2.8.11 Distribuição de pacientes acidentados no trabalho segundo tempo de internação em dias

Classe	Frequência
0 ⊢ 3	5
~~2~~3 ⊢ 6	8
6 ⊢ 9	11
9 ⊢ 12	4
12 ⊢ 15	5
15 ⊢ 17	2
Total	36

Classe	Frequência
1 dia	2
De 2 a 3 dias	6
De 4 a 7 dias	12
De 8 a 14 dias	14
Menos de 14 dias	2
Total	36

(2.8.12) - Conjunto de A: para achar numero de Classe $\sqrt{50} = 7{,}01 \approx 7$ amplitude dos dados: 70-24 = 46 ①

46 ÷ 7 = 6,6 ≈ 7

Ic = 46

24 ⊢ 31
31 ⊢ 38
38 ⊢ 45
45 ⊢ 52
52 ⊢ 59
59 ⊢ 66
66 ⊢ 73

Dados
n = 100
Minimo: 187
Maximo 821

At = 821 - 187 = 634
Nc = 1 + 3,3 log 100 ≈ 8
Ic = $\frac{634}{8}$ = 79,25 ≈ 80

2.8.13
Taxa do abandono no contra tuberculose pulmonar segundo a zona de moradia

185 ⊢ 250
250 ⊢ 315
315 ⊢ 380
380 ⊢ 445
445 ⊢ 510
510 ⊢ 575
575 ⊢ 640
640 ⊢ 705
705 ⊢ 770
770 ⊢ 835

P = $\frac{\text{N. abandonos}}{\text{total}}$ 15 + 80 = 95

P = $\frac{15}{95}$ × 100 = 15,79%

zona rural
70 + 35 = 105 P = $\frac{70}{105}$ × 100 = 66, = 66,67%

zona	sim	Não	total	taxa de abandono
urbano	15	80	95	15,8%
Rural	70	35	105	66,7%
total	85	115	200	42,5%

2.8.14 Distribuição de frequência dentista segundo adoção método de prevenção de cárie e doença gengivais no consultório

Prevenção	Frequência	Percentagem
Sim	78	78%
Não	22	22%
total	100	100%

total de dentista 100
Sim 78
Não 22

A pratica de prevenção deveria ser adotada por 100 % dos dentista