classe	intervalo
1	187 - 251
2	251 - 315
3	315 - 379
4	379 - 443
5	443 - 507
6	507 - 571
7	571 - 635
8	635 - 699
9	699 - 763
10	763 - 827

R: Uma solução possível é utilizar 7 classes para o conjunto A e 10 classes para o conjunto B, com larguras aproximadamente de 7 e 64 unidades, respectivamente. Os limites devem ser interpretados sem sobreposição entre classes.

2.8.13 - Taxa de abandono do tratamento da tuberculose

Dados:

Zona de moradia	Abandonaram (sim)	Não abandonaram
Urbana	15	80
Rural	70	35

calcular o total de pacientes de cada zona

Zona urbana $N_U = 15 + 80 = 95$

Zona rural $N_R = 70 + 35 = 105$

Aplicar a fórmula da taxa de abandono

~~Taxa de abandono = Nº de abandono~~

Taxa de abandono = $\frac{\text{Nº de abandono}}{\text{Total da Zona}} \times 100$

Zona Urbana

$TU = \frac{15}{95} \times 100 = 15,7894$

Zona rural:

$TU = 15,79\%$

$TR = \frac{70}{105} \times 100 =$

$TR = 66,67\%$

Zona de moradia	Total de pacientes	Abandonaram	Taxa de abandono
Urbana	95	15	15,79%
Rural	105	70	66,67%

R: A taxa de abandono é de 15,79% na Zona Urbana e de 66,67% na Zona rural.

2.8.14 prática de prevenção nos consultorios dentarios

Dados N = 100

Sim 78 dentistas.

Não frequência desconhecida.

calcular a frequência dos que responderam "não"

$F_{NÃO} = 100 - 78$

$F_{NÃO} = 22$

calcula as frequências relativas

$$fr = \frac{fi}{N} \times 100$$

Sim: $\frac{78}{100} \times 100 = 78\%$

Não: $\frac{22}{100} \times 100 = 22\%$

Resposta	Fi	Fr
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

R: os resultados sugerem que a prevenção é uma prática comum entre os dentistas entrevistados. Contudo, as respostas não comprovam, por si só, que todos realizam essas práticas corretamente no atendimento.

2.8.15 - Frequência relativas dos óbitos por causa e sexo

A tabela apresenta o numero de óbitos no Brasil, em 2004 segundo os grupos de causas e o sexo.

calcular os totais por sexo

sexo masculino:

NM = 27437 + 76065 + 190383 + 59785 + 17530 + 107032 + 88563

NM = 522795

Sexo feminino

NF = 18154 + 62424 + 13519 + 46369 + 13165 + 20368 + 75399

NF = 373759

Total geral:

N = 522795 + 373759

N = 896554

calcular fr: $Fr\% = \frac{\text{óbito por causa}}{\text{Total de óbito do sexo}} \times 100$

Masculino

$fr\% = \frac{27437}{522795} \times 100$

$fr\% = 5,25\%$

Feminino:

$FM\% = \frac{18615}{373759} \times 100$

$FM\% = 4,98\%$

Grupo de causas	Masculino (%)	Feminino (%)
Doenças infecciosas e parasitárias	9,25	4,98
Neoplasias	14,55	17,32
Doenças do aparelho circulatórios	28,77	36,15
Doenças do aparelho respiratório	10,67	12,41
Afecções originadas no período perinatal	3,35	3,52
causas externas	20,47	5,45
Demais causas definidas	16,94	20,17
Total	100,00	100,00

Os valores estão arredondados a duas casas decimais

* No sexo masculino, as doenças do aparelho circulatório representam a maior percentagem, com 28,77%.
* No sexo feminino, também predominam as doenças do aparelho circulatório, com 36,15%.
* As causas externas representam 20,47% dos óbitos masculinos, contra 9,45% dos femininos.

R: As doenças do aparelho circulatório são o principal grupo de causas de óbito em ambos os sexos, segundo os dados apresentados. As causas externas têm uma proporção muito maior entre os homens

2.8.16 - Frequências relativas por faixa etárias.

Dados:

faixa etária	Nº de pacientes
30-40 anos	30
40-50 anos	66
50-60 anos	119
60-70 anos	66
70-80 anos	24
80 anos e mais	5

calcular o total

$N = 30 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5$

$N = 290$

calcular as fri: $FH\% = \frac{fi}{N} \times 100$

faixa de 30-40 anos: $\frac{10}{290} \times 100 = 3,45\%$

faixa de 40-50 anos: $\frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

faixa de 50-60 anos: $\frac{119}{290} \times 100 = 41,03\%$

faixa de 60-70 anos: $\frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

faixa de 70-80 anos: $\frac{24}{290} \times 100 = 8,28\%$

faixa de 80 anos e mais: $\frac{5}{290} \times 100 = 1,72\%$

Faixa etária	fi	FH (%)
30-40 anos	10	3,45
40-50 anos	66	22,76
50-60 anos	119	41,03
60-70 anos	66	22,76
70-80 anos	24	8,28
80 anos e mais	5	1,72
Total	290	100,00

Identificar a faixa mais frequente
A maior frequência é 119 pacientes, correspondente à faixa de 50 a 60 anos.

R: A faixa etária de 50 a 60 anos apresenta a maior frequência, com 41,0 dos pacientes.

2.8.17 percentagem de órgãos aproveitados.

Dados:

órgão	Nº de dadores	Nº de orgão aproveitados
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmão	105	17

taxa de aproveitamento = $\frac{\text{Nº de órgãos aproveitados} \times 100}{\text{Nº de dadores}}$

Taxa de cada órgão.

a) Rim $T = \frac{210}{105} \times 100$

$T = 2 \times 100$

$T = 200\%$

b) coração

$T = \frac{45}{105} \times 100$

$T = 42,86\%$

c) fígado: $T = \frac{20}{105} \times 100$

$T = 19,05\%$

d) pulmões: $T = \frac{17}{105} \times 100$

$T = 16,19\%$

órgão	Dadores	órgãos aproveitados	taxa calculada
Rim	105	210	200,00%
Coração	105	45	42,86%
fígado	105	20	19,05%
Pulmões	105	17	16,19%

Rim foram aproveitados 210 rins de 105 dadores. O resultado é 200% porque cada dador pode fornecer dois rins

coracão: foram aproveitados 45 coraçães para 105 dadores.

Figado: foram aproveitados 20 figados.

pulmões: foram aproveitados 17 registos de órgaos pulmonares.

R: As taxas calculadas são 200% para os rins, 42,8 para os coracões, 19,0 para os figados é 16,1 para os pulmões.

Ermissa Lopes

Nº: 182

Tª: B