4.6.24

R: A medida de tendência central que não pode ser calculada é a média aritmética porque na última categoria podemos observar 4 ou mais, não sabendo o valor exato, não conseguimos saber se é 4 ou 5 ou mais reclamações

4.6.12 Média?

$S = 2,5 + 4,9 + 4,1 + 1,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 7,4 + 1,6 + 0,5$

$S = 36,2 \quad \bar{x} = 3,62$ ml é a média

$\frac{36,2}{10}$

4.6.13 Sim podem ser iguais por exemplo;

8; 16; 2; 8; 6

Media = $\frac{40}{5} = \bar{x} = 8$

Mediana Rol: 2; 6; 8; 8; 16

$\bar{x}$ é 8

Moda = 8; pois repete duas x

Sexo feminino

$S = 0,9 + 1,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7$

$S = \frac{4,8}{6}$ $\bar{x} = 0,8$ Ltro - se é a média

Mediana Rol: 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1,3

$M = \frac{(0,7 + 0,8)}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75$ Ltr - se é a mediana

Não existe a moda, pois nenhum número repete mais de uma veg.

4.6.15 Mediana e a moda?

→ ~~Moda~~ Mediana

Rol: 15 ; 15 ; 20 ; 20 ; 25 ; 30 ; 30 ; 35 ; 40 ; 50

$M = \frac{25 + 30}{2}$ $M = 27,5$

Moda: é 15 ; pq repete mais x .

8.) Pressão Arterial, em mmHg

S = 5 - 180; 200; 140; 120; 170; 130; 140; 140; 180; 160; 190;

5 = 1820 ÷ 11 = 165,455 - É a média

Medidas

Rol = 140; 140; 140; 140; 130; 160; 170; 180; 190; 200;

$\frac{n+1}{2} = \frac{11+1}{2} = 6$

A mediana é 160 mmHg.

4.6.4 Nº médio de dentes caninos?

Sexo Masculino

5 = 16+2+3+2+2 = 25

Sexo Feminino

5 = 13+5+3+2+2 = 25

4.6.

4.6.3 Me

Sexo M

5 = 6+9

A moda

Mediana

6+4 = 1

Sexo Feminino

5: 4 + 10 + 6 + 7 + 6 + 8

5: 41 / 6 x̄ = 7 → É a média

Moda → Existe duas 6 e 8

Mediana Rol = 4; 6; 6; 7; 7; 10

(6 + 8) / 2 = 14 / 2 = 7 → é a mediana

4, 6, 10 Média, Moda e Mediana?

Sexo Masculino

5 = 0,5 + 0,4 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,5

5 = 5,4 / 6 x̄ = 0,9 Litros → é a média

Mediana Rol: 0,5; 0,5; 0,7; 0,9; 1,3; 0,4

M = (0,8 + 0,9) / 2 = 1,7 / 2 = 0,85 Litro

4.5. Tempo médio de latência?

-5

4.6. Média, Moda e Mediana?

Sexo Masculino

5 = 6+9+6+8+7+6 = 42/6 = 7 -> É a média

A moda é 6, porque aparece + vezes

Mediana Rol: 6; 6; 6; 7; 8; 9;

6+7 = 13/2 = 6,5 -> É a mediana

- 25

édia

1.200,00

4.6.2 Tendência Central

R: Nesse caso a medida de tendência central é mediana, porque se o nº de carros que ultrapasse é igual ao nº de carros que me ultrapassam, isto significa que a minha minha velocidade é dividida em 2 partes iguais.

4.6.3

R: A moda é a medida que sempre corresponde a um valor numérico do conjunto de dois identifica o valor que aparece com mais frequência...

4.6.4 Nº de
Média
Idade da

Bem a mé
diferença

Nesse caso

$\frac{80}{4}$

Sendo as

20 + 40

Uma veg

Média =

R: A m
porque
com

Mediana

Rol: 1,58; 1,65, 1,68, 1,65; 1,69, 1,68, 1,73, 1,75; 1,75, 1,80

Ordem;

Pe: (n+1) / 2 = 11+1 / 2 = 6°

Mediana é 1,68 m.

2) Peso (em quilogramas)

S: 90+80+80+76+70+66+72+70+75+70+70

$\bar{x}$ = 798 / 11 = 72,54 Kg.


A média é de 72,54 Kg.

Mediana

Rol: 60; 65, 70, 70, 70, 70, 72, 76, 76, 80, 90

Mediana é 70 Kg.

9.5.1



Leve 40%

Severo 15%

Moderado 45%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Porcentaje

40%

15%

7,5%

37,5%

A 3 AB O

Tipo Sanguíneo

Mediana Rol: 4; 6; 10; 10; 16; 20

20 : 10 = 2

Mediana = 10 ; Moda = 10, Pois repete mais x

d) 0; -2; 3; -1; 5

Media = 5 / 5 = 1

Mediana Rol: -1; 0; 3; 5

Ln = 0

Moda = Não existe moda, pois nenhum valor se repete

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

Media = 14 / 7 = 2 ; Mediana Rol: -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

Ln = 1

Moda = 1 e 2; pois têm a mesma frequência

d) Frequência de cada categoria:

Estádio	F_i	Fre%
moderado	9	45%
leve	8	40%
severo	3	15%
Total	20	100%

45
40
15

c.f.c.s

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: Existe um intervalo sem falta o 50-60

E a conectoficaria;
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 e mais o

Exercice n°1

o/o

1 = 25%

a % = % x N
100

15

615, Chap 01

289

Classe
70 ⊢ 75 ; 75 ⊢ 78 ; 78 ⊢ 81 ;
81 ⊢ 87 ; 87 ⊢ 90 ; 90 ⊢ 95
95 ⊢ 100 ; 100 ⊢ 107 , 107 ⊢ 113
113 ⊢ 118 ;

1.

Valeur min = 70 Hg

Valeur max : 118 Hg

N° de données : 10

C.P.G	P_i	$F_{mi}\%$
Tipos de fonte	Dos Alunos	
A	16	40%
B	6	15%
AB	3	7,5%
O	15	37,5%
Total	40	100%

C.P.T

Alunos	$F_{mi}\%$
Grau A	25%
Grau B	70%
Grau C	5%
Total	100%

$A + B + C = 100\%$

$A + 70\% + 5\% = 100\%$

$A = 100\% - 75\%$; $A = 25\%$

(P.S) Transformando a P.em

Frequência seria $F = \frac{\% \times N}{100}$

$\Rightarrow F = \frac{25 \times 80}{100} = \frac{2000}{100}$ $F = 20$

C.P.J	P_i	$F_{mi}\%$
Estágiade	615	
Tentadend	Teba m timbam Duração de 615, Cicl	
Tebam	190 timbam sucção	
timbam	518 ngaram chupeta	
timbam	618 [illegible] mamadeira	

C
70
81
95
11

Valor mí
Valor máx
Nº de donnes

4.6.1

a) 4; 3; 0; 6; 8;

Media: $\frac{21}{5} = 5,2$

Mediana Ord: 0; 3; 4; 6; 8;

↳ 4,0

Moda = 8,0 → Sin repele ↓

b) 4; 16; 2; 8; 6

Media: $\frac{40}{5} = 8,0$; Mediana = 8,0

$\rightarrow 2; 6; 8; 8; 16$

Moda = 8 → Sin repele ↓

c) 4; 16; 16; 6; 20; 10

Media

tem-
amal
que
nº de
om, is-
a mi-
sla am

e, sempre
matemáticas
ica a
nais pre-

4.6.4 Nº de pessoas = 4
Média : 20 anos
Idade da pessoa q entrou = 40 anos

Bem a média é igual a soma dividindo pela quantidade

Nesse caso seria: 20 · $\frac{\text{Soma: } 20 + 4}{4}$

~~20 · 20~~
4

Sendo assim ficaria 20 + a pessoa nova

20 + 40 = 120 a

Uma vez q temos cinco pessoas seria;

Média = $\frac{120}{5}$ = 24 a

R: A média aumentaria de 20 para 24 anos porque entrou uma pessoa com 40 anos, com idade superior a média ....

2.p.3

Nome do aluno	Frequência	Frequência Relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1.0

2.d.4

Pacientes

~~Moderado~~	~~Leve~~	~~Leve~~ ~~Severo~~	Leve
Moderado	Moderado	Leve Severo	Moderado
~~Moderado~~	Moderado	Leve	

Paciente 28 Pacientes	Moderado	Leve	Leve
	Severo	Leve	Moderado
	Moderado	Moderado	Leve
	Severo	Moderado	Moderado
	Moderado	Leve	

d) Frequên

Estádio	
Moderado	45
Leve	40
Severo	15
Total	

2.d.5 Pa

	20
	30
	40
	60
	70

2.d.3

Nome da alunos	Frequência	Frequência Relativa
Deja 60	16	0,08
De 6 a 6,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1.0

45
40

2.d.4

0,75 45

Pacientes

~~Moderado~~	~~Leve~~	~~Leve~~ ~~Severo~~	Leve
Moderado	Moderado	Leve	Severo Moderado
~~Moderado~~	Moderado	Leve	

Pacientes	Moderado	Leve	Leve
28	Severe	Leve	Moderado
Pacientes	Moderado	Moderado	Leve
	Severe	Moderado	Moderado
	Moderado	Leve	

11 d
1 d

7 d - 75 ; 75 - 77 d , 7 d - 84 ; - 84 - 97 . 97 - 90 ; -

Continuare ... continuare

b) E una variabilă calitativă discretă nominală;

c) E una variabilă cantitativă continuă;

d) E una variabilă cantitativă continuă;

e) " " " calitativă nominală;

f) " " " cantitativă discretă;

g) " " " cantitativă discretă;

h) " " " cantitativă continuă;

	Localități	f_i	F_i %
	Pecsod 5	59	6,96 %
	Bălinbom		
	Șimiș	425	49,88 %
	Lovanom'Ș	368	43,19 %
	Cantnóm'Ș	852	99,9 ≈ 100 %

:20

2.1.1 a) É uma variável quantitativa contínua...

b) É uma variável qualitativa discreta;

c) É uma variável quantitativa contínua;

d) É uma variável quantitativa contínua;

e) " " " qualitativa nominal;

f) " " " quantitativa discreta;

g) " " " quantitativa discreta;

h) " " " quantitativa contínua;

2.1.2

Pessoas	f_i	F_i %
Solteiras	59	6,9%
Casadas	425	49,8%
Separadas	368	43,1%
	852	99,9 ≈ 100%

59 . 100 = 425 . 100