f=B N=275

A) peso de pessoa tipo de variável quantitativa continua

B Marcas comerciais do mesmo analgésico: Qualitativa nominal

c - temperatura das pessoas: quantitativa (dts) continua

d - Quantidade anual de chuva em S. paulo : Quantitativa continua

e - Religião : Qualitativa nominal

F - Numero de dentes: quantitativa discreta

g) Numero de bebês...: Quantitativa discreta

h. Comprimento de cores: Quantitativa continua

Exen 2.8.2

Total das pessoas entrev: = 852

nesiante eram continentais e?

- 852 - 59 - 425 = 368 continente

opinião	Fi	Fn	Fi acu	Fn acu
Favorável	425	49,88	425	49,88
Continente	368	43,19	793	93,18
S. opinião	59	6,92	852	100
total	852	100%		

2.8.3

$$\text{frequência} = \frac{F}{N}$$

$$F = F_n \times N$$

→ $F = 0,8 \times 200 = 16$

Nota dada	Frequência	Fn
DE 7 a 10	16	0,08
8 a 8,9	36	0,18
6,5 a 7,9	90	0,45
5 a 6,4	30	0,15
abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,0

~~(16+36~~

2.8.4

20 paciente

Leve: 8 paciente

Moderado: 9 paciente

Severo: 3 paciente

$$Fn_{leve} = \frac{8}{20} = 0,4$$

$$Fn_{moderado} = \frac{9}{20} = 0,45$$

$$Fn_{severo} = \frac{3}{20} = 0,15$$

t=B NE 275

2.8.5
Falta a classe 50-60.

2.8.6

Banco sangue	Frequencia	Fn
A	16	0,4
B	6	0,15
O	15	0,375
AB	3	0,075
Total	40	1

2.8.7
grau A = 100% - 70% - 5%

A = 25%

$F = \frac{25 \times 80}{100} = \frac{2000}{100} = 20$

20 alunos receberu grau A.

2.8.8. Criança entre 3 e 6 anos

	F	Fn
N. lim. H de sucção	615	0,3058
H. de sucção de polegar	190	0,0944
usavam chupeta	588	0,2923
usava mamadeira	618	0,3073
Total	2011	

615 ÷ 2011 ≈ 0,3058

2.8.9.

Amplitude

$A = x_{maior} - x_{menor}$

$A = 118 - 70 = 48\,kg$

$h = \frac{A}{k} \Rightarrow h = \frac{48}{10} = 4{,}8\,kg \approx 5\,kg$

Classe mais quais os pesos possam ser agrupados.

70 — 75	95 — 100
75 — 80	100 — 105
80 — 85	105 — 110
85 — 90	110 — 115
90 — 95	115 — 120

2.8.10.

Calculo para o intervalo de classe.

$h = x_{maior} - x_{menor}$

$h = 25 - 20 = 5$

- Intervalo de toda a distribuição

$A = 50 - 20 = 30$ "

2.8-11

Tempo	Fi	Fn	Fiac	Fn ac
1 a 3 dias	8	22,22	8	22,22
4 a 6	7	19,44	15	41,66
7 a 9	10	27,77	25	69,43
10 a 12	6	16,66	31	86,09
13 a 15	4	11,11	35	97,2
16 a 18	1	2,77	36	99,97
total	36	100 %		

100 — 36
x — 8

800 x 36 = 22,22

2.8.12 6-Turno A

$K = 1 + 3,3 \log(50)$

$K = 1 + 3,3 \cdot 1,69 = 6,5 \approx 7$

$A = 70 - 24 = 46$ / $h = \frac{46}{7(K)} = 6,57$

Coluna B

$k = 1 + 3{,}3 \log_{10}(100)$

$k = 1 + 3{,}3 \cdot 2$

$k = 1 + 6{,}6$

$k = 7{,}6 \approx 8$

$A = 821 - 187$

$= 634$

$h = \frac{634}{8}$

$h = 79{,}25$

Intervalos de A

$[24 ; 31[$

$]31 \text{ a } 38[$

$]38, 45[$

$]45, 52[$

$]52, 59[$

$]59 ; 66[$

$]66 \text{ a } 73]$

Intervalos B

$[187 ; 267[$

$]267 ; 347[$

$]347 ; 427[$

$]427, 507[$

$]507 ; 587[$

$]587 ; 667[$

$]667 ; 747[$

$]747 \text{ a } 827]$

2.8.14

*100 - 78 = 22 que disseram não

$Fn = \frac{78}{100} = 0,78$ $Fn = \frac{22}{100} = 0,22$

Resposta	Fi	Fn
Sim	78	78
Não	22	22
Total	100	100%

3.5.1

2o paciente

Leve - 8
Moderado - 9
severo - 3

Gráfico de setores

Leve: 0,4 x 360 = 144
Moderado: 0,45 x 360 =
severo = 0,15 x 360 = 54

