2.8.15. Calcule as F. relativas... e comente

a) obitos M

$N_M = 27437 + 76065 + 150383 + 55785 + 17530 + 107032 + 88563 = 522795$

b) obitos F

$N_F = 18615 + 64724 + 135119 + 46369 + 13165 + 20368 + 75399 = 373759$

Grupos de causas	Homens (Fri)	(%)	Mulheres (Fri)	(%)
D. I e P	0,0525	5,25	0,0498	4,98
N	0,1455	14,55	0,1732	17,32
D. AC	0,2877	28,76	0,3615	36,15
D. AR	0,1067	10,67	0,1241	12,41
AOPP	0,0335	3,35	0,0352	3,52
CE	0,2047	20,47	0,0545	5,45
Demais	0,1694	16,93	0,2017	20,18
total				

R: Entre os obitos registados em ambos os sexos, as doenças do aparelho circulatório representam a maior percentagem dentro de cada grupo.
As causas externas têm uma percentagem muito maior entre os homens do que entre as mulheres.

REDMI A5 27/10/2026 17:04

2.8.13.

Zona de moradia	sem	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35

Calcul perc. de pac. que abandonaram o tr.

a) zona urbana
15 + 80 = 95
$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$.

b) zona rural
70 + 35 = 105
$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$.

2.8.14. 100 → dentistas
78 → sem as demais → não
tabela de dis.
100 − 78 = 22

sim) $Fri = \frac{78}{100} = 0,78 = 78\%$. não) $Fri = \frac{22}{100} = 0,22 = 22\%$.

Resposta	Fi	Fri	%
sim	78	0,78	78%.
não	22	0,22	22%.
total	100	1,00	100%.

R: A maioria dos dentistas (78%.) afirmou utilizar métodos de prevenção na consultório, portanto os resultados mostram que a prática da prevenção era adotada pela maioria dos dentistas entrevistados.

REDMI A5 27/10/2026 17:04

2.8.16. C. Fri, faixa etária de > risco

Faixa etária	Fi	Fri	%
30 ⊢ 40	10	0,0345	3,45%
40 ⊢ 50	66	0,2276	22,76%
50 ⊢ 60	119	0,4103	41,03%
60 ⊢ 70	66	0,2276	22,76%
70 ⊢ 80	24	0,0828	8,28%
80 ou mais	5	0,0172	1,72%
total	290	1,0000	100%

$n = 10+66+119+66+24+5$
$n = 290$

R: A faixa dos 50 aos menos de 60 anos, é a faixa etária de maior risco, isto porque apresenta a maior quantidade de pacientes (119), correspondendo a 41,03% do total.

2.8.17. Calc. perc. $\frac{Nº\ a.\ pf}{Nº\ d} \times 100$ de órgãos aproveitados.

Órg	Nº de doadores	Nº de órg aprov.
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17

a) Rim $\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

b) coração $\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

c) Fígado $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

d) pulmões $\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$

REDMI A5
27/10/2026 17:05

intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 14 dias, mais de 14 dias.

A)

T. de interva..	Fi
1-5 dias	13
6-10 dias	14
11-15 dias	8
16-20 dias	1
total	36

B)

T. de interva.	Fi
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
4 a 7 dias	12
8 a 14 dias	14
mais de 14 dias	2
total	36

2.8.12. A e B, $n = 50$ e $n = 100$

A, valor min - 24 valor max - 70

B, valor min - 187 valor max - 821

intervalos de classe...

conjunto A

$A = 70 - 24 = 46$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(n)$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(50)$

$K = 6,64 \quad K \approx 7$

$h = \frac{46}{7} \approx 6,57$

$h \approx 7$

conjunto B

$B = 821 - 187 = 634$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(100)$

$K = 7,64 \quad K \approx 8$

$h = \frac{634}{8} \approx 79,25$

$h \approx 80$

REDMI A5 27/10/2026 17:03

Categoria	Fi	Fri	%
Sem habito de sucção	615	0,3058	30,58
Sucção do polegar	190	0,0945	9,45
Uso de chupeta	588	0,2924	29,24
Uso de mamadeira	618	0,3073	30,73
Total	2011	1,0000	100

2.8.10. Classe

20 ⊢ 25
25 ⊢ 30
30 ⊢ 35
35 ⊢ 40
40 ⊢ 45
45 ⊢ 50

R: O intervalo de classes é 5.
Limite maior - limite menor
50 - 20
O intervalo total é 30.

2.8.9. Pesos dos B. entre 70 kg e 118 kg.
10 classes

classes	Peso
1	70 ⊢ 75
2	75 ⊢ 80
3	80 ⊢ 85
4	85 ⊢ 90
5	90 ⊢ 95
6	95 ⊢ 100
7	100 ⊢ 105
8	105 ⊢ 110
9	110 ⊢ 115
10	115 ⊢ 120

2.8.11.

7	8	1	7	13	6
12	12	3	17	4	2
4	15	2	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

REDMI A5 27/10/2026 17:03

tipo sanguíneo	Fi	Fri (%)	Fi ac	Fri ac (%)
A	16	0,4	16	0,4
B	6	0,15	22	0,55
AB	3	0,075	25	0,625
O	15	0,375	40	1
total	40	1	—	—

2.8.7. 80 alunos, 70% receberam grau B e 5% grau C.
. Quantos (F) alunos receberam grau A...

70% + 5% = 75% total = 100%

100% - 75% = 25% → receberam grau A

$F = \frac{25}{100} \times 80 \Leftrightarrow F = 0,25 \times 80 \Leftrightarrow F = 20$

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8. 3 a 6 anos de idade
615 m tenha hábito de sucção.
190 tenha
588 chupeta
618 → mamadeira
tabela → Calcule o total e as fr. relativas.
n = 615 + 190 + 588 + 618
n = 2011

$Fri = \frac{fi}{n}$

REDMI A5 27/10/2026 17:02

2.8.1.

a) Peso de pessoas = variável quantitativa contínua
b) marcas comerciais de um mesmo analgésico = variável qualitativa nominal
c) Temperatura de pessoas variável quantitativa contínua
d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo variável quantitativa contínua
e) religião variável qualitativa nominal
f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança; variável quantitativa discreta
g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade variável quantitativa discreta
h) comprimento de cães variável quantitativa contínua

2.8.2. 852 pessoas entrevistadas
59 não tinham opinião
425 eram favoráveis
as demais foram contrárias

total = favoráveis + sem opi + cont.
cont = 852 - 425 - 59
cont = 368

$F_{ri} = \frac{F_i}{n}$

Favoráveis
$F_{ri} = \frac{425}{852}$
$= 0,4988$
49,88%

Sem opi
$F_{ri} = \frac{59}{852}$
$= 0,0692$
6,92%

cont.
$F_{ri} = \frac{368}{852}$
$= 0,04319$
43,19%.

REDMI A5
27/10/2026 17:01

opinião	Fi	Fri	(%)
Favoráveis	425	0,4988	49,88%.
Sem opinião	59	0,0692	6,92%.
contrárias	368	0,4319	43,19%.
total	852	1,0000	100%.

2.8.3. Complete a tabela

$Fr_i = \frac{F_i}{n} \Leftrightarrow Fr_i = 0,08$

$F_i = Fr_i \times n \Leftrightarrow F_i = 0,08 \times 200 = 16$

Distribuição dos notas de 200 alunos.

Nota dos alunos	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,0

2.8.4. doença (leve, moderada e severa
Foram examinados 20 pacientes

Dados: moderada, leve, leve, severa, leve, moderada, moderada, moderada, leve, leve, severa, leve, moderada, moderada, leve, severa, moderada, moderada, moderada, leve.

a) Determine a F de cada categoria
b) Calcule a Fri.

REDMI A5
27/10/2026 17:01

a) Leve → 8 pacientes
Moderada → 9 pacientes
Severa → 3 pacientes
} total 20

b) $Fri = \frac{F}{N}$

Leve: $Fri = \frac{8}{20} = 0,4 = 40\%$. Severa: $Fri = \frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$

Moderada: $Fri = \frac{9}{20} = 0,45 = 45\%$.

Estratos de doença	Fi	Fri
Leve	8	0,4
Moderada	9	0,45
Severa	3	0,15
total	20	1

2.8.5. Qual é a erro?

classe
20-30
30-40
40-50
60-70
70 e mais

R: Falta a classe 50-60, As classes devem estar organizadas de forma continua.

2.8.6. tipos de sangue 40 doadores
B, A, O, A, A, A, B, O, B, A, A, AB, O, O, A, O, O, A, A,
B, A, A, A, O, O, O, A, O, A, O, O, A, O, AB, O, O, A,
AB, B, B.

. tabela de destribuição de F.

27/10/2026 17:02
REDMI A5