Exercícios 2.8

2.8.1 - a) Peso de pessoas - (variável contínua)

b) marcas comerciais de um mesmo analgésico - V.n

c) temperatura de pessoas - (variável contínua)

d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo - (variável contínua)

e) Religião - (variável nominal)

f) Número de dentes permanentes irrompidos em uma criança - (variável discreta)

g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade - (variável discreta)

h) comprimento de cães - (variável contínua)

2.8.2 -

Respostas	F_i	$Fri\%$
Não tinham opinião	59	6,9
Favoráveis	425	49,9
Contrários	368	43,2
Total	852	100

2.8.3

Distribuição dos notas de 200 alunos

Nota do aluno	F_i	F_n
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4

Distribuição dos estágios dos doenças dos facientes

Estagios	F_i	F_n %
Levi	8	40
Moderado	9	45
Senbro	3	15
Total	20	100

2.8.5 - O erro na distribuição de frequência é que não há o intervalo de 50-60.

2.8.6. Distribuição dos tipos sanguíneos de 40 doadores.

Tipos de sangue	F_i	$F_i\%$
B	6	15
A	16	40
O	15	37,5
AB	3	7,5
Total	40	100

2.8.7. A frequência dos alunos que receberam o grau A é igual a 20, ou seja, 20 alunos receberam o grau A.

2.8.8. Distribuição de crianças no estágio de dentadura decídua.

Hábito de sucção	F_i	$F_i\%$
Não tinham esse hábito	615	30,58
Sucção do polegar	190	9,45
Sucção de chupeta	588	29,24
Sucção de mamadeira	618	30,73
Total	2011	100

2.8.9 Amplitude = 118 kg - 70 $\Leftrightarrow$ Ampl = 48

Intervalo entre as classes = $\frac{48}{10} = 4{,}8 \simeq 5$

70 ⊢ 75
75 ⊢ 80
80 ⊢ 85
85 ⊢ 90
90 ⊢ 95
95 ⊢ 100
100 ⊢ 105
105 ⊢ 110
110 ⊢ 115
115 ⊢ 120

2.8.10-Dados

Nº de classe = 6
Maior valor = 49,99
Menor valor = 20

Resolução

AT = 49,99 - 20
= 29,99

$h = \frac{29{,}99}{6} \simeq 5$

R: O intervalo de classes é igual a 5 e o intervalo de toda distribuição é igual a 29,99.

2.8.11- AT = 17 - 1 $\Leftrightarrow$ 16 $\quad h = \frac{16}{6} = 2{,}6 \simeq 3$

Dias	Fi	Fn %
1 ⊢ 4	8	22,2
4 ⊢ 7	7	19,4
7 ⊢ 10	10	27,8
10 ⊢ 13	6	16,7
13 ⊢ 16	4	11,1
16 ⊢ 19	1	2,8
Total	36	100

Dias	Fi	Fn %
1	2	3,56
2 ou 3	6	16,67
4 a 7	12	33,33
8 a 14	14	38,89
> 14	2	5,56
Total	36	100

2.8.12 - Intervalos de classe do conjunto A

$n = 50$
$M = 70$
$m = 24$
$AT = 70 - 24$
$= 46$
$h = \frac{46}{7}$
$= 6,6$
$\simeq 7$

24 ⊢ 31
31 ⊢ 38
38 ⊢ 45
45 ⊢ 52
52 ⊢ 59
59 ⊢ 66
66 ⊢ 73

Intervalos de classe do conjunto B

$n = 100$
$M = 821$
$m = 187$
$AT = 821 - 187$
$= 634$
$h = \frac{634}{8}$
$= 79,25$
$\simeq 80$

187 ⊢ 267
267 ⊢ 347
347 ⊢ 427
427 ⊢ 307
507 ⊢ 587
587 ⊢ 667
667 ⊢ 747
747 ⊢ 827

2.8.13 -

Zona urbana
$n = 15 + 80$
$= 95$

$fn = \frac{fi}{n} \times 100\%$
$= \frac{15}{95} \times 100\%$
$= 15,8\%$

Zona rural
$n = 70 + 35$
$= 105$

$fn = \frac{fi}{n} \times 100\%$
$= \frac{70}{105} \times 100\%$
$= 66,7\%$

2.8.14

Dentistas que usam métodos de prevenção	fi	fn%
Sim	78	78
Não	22	22
total	100	100

Os dados mostram que a maior parte dos dentistas adotam práticas de prevenção, sendo 78% dos dentistas.

2.8.15

Grupos de causa	fi(M)	fi(F)	fn(M)	fn(F)
D.I.P	27.437	18615	5,25	4,98
Neoplasias	76.065	617211	14,55	17,32
D.A.C	150383	135119	28,77	36,15
D.A.R	55785	46369	10,67	12,41
A.O.P.P	17530	13165	3,35	3,52
Causas externas	107032	20368	20,47	5,45
Demais causas definidas	88363	75399	16,94	20,17
Total	522793	373759	100%	100%

As doenças do aparelho circulatório são as mais prevalentes tanto no sexo masculino quanto no feminino.