Exercício 3.5 1) - Gráfico de setores

1º contar os pacientes
Os 20 pacientes foram classificados em três estágios:

Leve: 6 pacientes
Moderado: 10 pacientes
severo: 4 pacientes

calcular a fr. $FR = \frac{f}{N}$

Estágio leve: $FR = \frac{6}{20} = 0,30 = 30\%$

Estágio moderador: $fr = \frac{10}{20} = 0,50 = 50\%$

Estágio severo: $FR = \frac{4}{20} = 0,20 = 20\%$

calcular os ângulos do gráfico

$$\text{Ângulo} = \frac{f}{N} \times 360°$$


processou durante, em 23s.

Estágio	Fi (f)	FR	Ângulo
leve	9	45%	9/20x360 = 162°
Moderado	8	40%	8/20x360 = 144°
severo	3	15%	3/20x360 = 54°
Total	20	100%	360°

0 valores corretos são 9 pacientes leves, 8 moderados e 3 severos. Assim, o gráfico de setores deve ter três partes: 162, 144° e 54°.

Exercícios 3.5.2 Gráfico de barras

Tipo de sangue	F
A	18
B	7
AB	3
O	12
Total	40



Exercícios 3.5.3

Dados:
Sem hábitos de sucção: 615 crianças.
Sucção do polegar: 190 crianças.
Uso de chupeta: 588 crianças.
Uso de mamadeira: 618 crianças.

calcular o total.
$N = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011$

calcular a fr e o ângulo.

$$FR = \frac{f}{N} \times 100$$

$$\text{Ângulo} = \frac{f}{N} \times 360°$$

~~Ângulo = ... x 360~~


Categoria	f:	fr	Ângulo aproximado
Sem hábitos	615	30,58%	110,08°
Polegar	190	9,45%	34,01°
Chupeta	588	29,24%	105,23°
mamadeira	618	30,73%	110,68°
Total	2011	100%	360°

Exercícios 3.5.4 Histograma
Dados em classes iguais:

O menor valor é 1 dia e o maior é 17 dias.

de o histograma

Tempo de internamento (dias)	F
1-4	11
5-8	13
9-12	7
13-16	4
17-20	1
Total	36



3.5.5 - gráfico de setores por zona de moradia.

A) zona urbana

Dados: 15 abandonaram o tratamento
80 não abandonaram.
Total: $N = 15 + 80 = 95$

Percentagem:
Abandonaram: $\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

Não abandonaram: $\frac{80}{95} \times 100 = 84,21\%$

Ângulo $\frac{15}{95} \times 360° = 56,84°$

$\frac{80}{95} \times 360° = 303,16°$

B) Zona rural
Dados: 70 abandonaram o tratamento e 35 não abandonaram

Total: $N = 70 + 35 = 105$

percentagem: Abandonaram:

$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

Não abandonaram: $\frac{35}{105} \times 100 = 33,33\%$

Ângulos: $\frac{70}{105} \times 360° = 240°$


$\frac{35}{105} \times 360° = 120°$

Zona	Abandonaram	Angolo	Não abandonaram
Urbana	15,79%	56,84°	84,21%
rural	66,67%	240°	33,33%

A percentagem de abandono é maior na zona rural com 66,67% do que na zona urbana com 15,79%.


3.5.6 gráfico de barras horizontal

Grupo de causas	Masculino (milhares)	feminino milhares
Doenças infecciosas e parasitárias	27,44	18,62
Neoplasias	76,07	64,72
Doenças do aparelho circulatório	150,38	135,12
Doenças do aparelho respiratório	55,79	46,37
Afecções do período perinatal	17,53	13,17
causas externas	107,03	20,37
Demais causas definidas	88,56	75,40



Exercício 3.5.7 Histograma.

Faixa etária (anos)	Frequência
30 - 40	30
40 - 50	66
50 - 60	119
60 - 70	66
70 - 80	24
80 ou mais	5
Total	290



A barra mais alta corresponde à faixa dos 50 a 60 anos, com 119 pacientes.

Exercício 3.5.8 - Gráfico de barras horizontais.

A taxa de aproveitamento

$$\text{Taxa} = \frac{\text{orgãos apr}}{\text{número de doadores}} \times 100$$

calcular:

Rins: $\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$


coracão: $\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

Fígado: $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

Pulmões: $\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$

orgão	Taxa de aproveitamento
coracão	200%
fígado	42,86%
pulmões	19,05%
	16,19%

orgãos



Exercícios 3.5.9 - Tabela de frequências e Hystograma

Os Valores extremos

Valor mínimo: 64


Valor máximo: 96

Amplitude Total

$AT = 96 - 64 = 32$

organizar os dados em cinco classes de amplitude aproximadada 7.

pressão diastólica	Frequência
64 - 70	3
71 - 77	5
78 - 84	12
85 - 91	8
92 - 98	2
Total	30




Exercício 3.5.10 - polígono de frequências.

Calcular o ponto médio de cada classe.

$PM = \frac{\text{limite inferior} + \text{limite superior}}{2}$

A classe 64 - 70 $PM = \frac{64+70}{2} = 67$

Classe	ponto médio	frequencia
64 - 70	67	3
71 - 77	74	5
78 - 84	81	12
85 - 91	88	8
92 - 98	95	2



Ygermissa Lopes

Nº: 182

Tª: B