4.6.10) 1- Sexo Masculino

D. 6 → 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} = 0,90$ L/dia

Mediana $= \frac{0,8+0,9}{2} = 0,85$ L/dia

Moda é 0,5

2- Sexo Feminino

D. 6 → 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6} = 0,80$ L/dia

Mediana $= \frac{0,7+0,8}{2} = 0,75$ L/dia

Não tem moda

4.6.11)

D. 6: 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 90

Mediana $= \frac{25+30}{2} = 27,5$ dias

Metade das pacientes retornou às atividades em menos dias de 27,5 dias. Não houve moda.

4.6.12) R: A média é 3,62 miligramas de ácido ascórbico em 100 ml.

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$

4.6.13) R: Sim é possível,

$\bar{x} = \frac{1+2+3+3+3+4+5}{7} = 3$

Mediana $p = \frac{7+1}{2} = 4 \rightarrow 3$

Mediana e a media são iguais a 3

Moda também igual à 3.


4.6.14) R°. A média não pode ser calculada

Porque a última classe é aberta (4 ou mais), pois ela não tem limite superior definido.


Para calcular a média em dados agrupados, precisamos de um ponto medio.

01/11/2026 23:44:51

3.5.1) Distribuição dos pacientes segundo o estágio da doença




3.5.2)




01/11/2026 23:45:05


35.3) Hábito de sucção



35.4 Distribuição de pacientes acidentados.




35.5




35.6

01/11/2026 23:45:23

35.6





01/11/2026 23:45:31