


# Brescia

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 43.12 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 43.38 °C | n sezioni: 1,729 (su 2,134 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n    | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|------|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 83   | 45.02      | 1.63      | 1.88 | 43.84 | 46.38 |
| Impianti sportivi           | 22   | 44.54      | 1.16      | 1.63 | 43.15 | 45.66 |
| Tessuto urbano continuo     | 1303 | 43.38      | 0.0       | 1.9  | 42.61 | 44.67 |
| Edifici pubblici e servizi  | 91   | 43.17      | -0.21     | 1.77 | 42.32 | 44.33 |
| Rete infrastrutturale       | 67   | 43.02      | -0.36     | 1.72 | 41.86 | 44.26 |
| Verde urbano                | 50   | 42.97      | -0.42     | 1.38 | 42.21 | 43.85 |
| Colture agricole            | 72   | 39.9       | -3.49     | 2.23 | 38.34 | 41.29 |
| Acqua e zone umide          | 1    | 36.56      | -6.82     | nan  | 36.56 | 36.56 |
| Superficie minerale nuda    | 7    | 36.14      | -7.24     | 1.84 | 34.86 | 37.83 |
| Vegetazione naturale        | 28   | 35.04      | -8.34     | 2.79 | 33.6  | 36.49 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 è parziale (stagione in corso).