


Imperia

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 37.69 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 37.84 °C | n sezioni: 355 (su 466 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Impianti sportivi	7	39.1	1.26	2.04	37.99	40.61
Superficie impervia pesante	18	38.55	0.7	2.55	36.09	40.89
Edifici pubblici e servizi	26	37.93	0.09	2.43	36.23	39.57
Tessuto urbano continuo	251	37.84	0.0	1.89	36.52	39.33
Rete infrastrutturale	27	37.17	-0.67	2.24	35.33	39.1
Acqua e zone umide	8	36.6	-1.25	3.56	33.38	39.24
Verde urbano	4	36.31	-1.54	2.36	35.08	37.52
Superficie minerale nuda	4	35.92	-1.92	1.76	35.08	37.24
Colture agricole	10	34.04	-3.8	1.15	32.96	34.9

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).